



Ibagué

Entre alas, colores y cantos

Guía de las aves más buscadas

Ediciones
Unibagué



Universidad
de Ibagué

Comprometidos con el desarrollo regional



Universidad de Ibagué

Facultad de Ciencias Naturales
y Matemáticas

Programa de Biología Ambiental

Ibagué, entre alas, colores y cantos
Guía de las aves más buscadas

Yair Guillermo Molina Martínez
Miguel Moreno Palacios

Ibagué, Colombia
2021

598.098

M722 Molina Martínez Yair Guillermo

Ibagué, entre alas, colores y cantos: guía de las aves más buscadas /
Yair Guillermo Molina Martínez, Miguel Moreno. Ibagué: Universidad de
Ibagué, 2021

206 p. 14 centímetros

ISBN Impreso 978-958-754-359-9

Digital 978-958-754-360-5

Descriptores: Aves-Tolima; Aves-Ibagué.

Universidad de Ibagué
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas
Programa de Biología Ambiental

Septiembre de 2021

© Universidad de Ibagué, 2021

© Colciencias, 2021|

© Yair Guillermo Molina Martínez, Miguel Moreno Palacios, 2021.

Cómo citar esta obra: Molina Martínez, Y.G. & Moreno Palacios, M. (2021). *Ibagué, entre alas, colores y cantos*. Guía de las aves más buscadas. Ibagué, Colombia. Ediciones Unibagué. doi: <https://doi.org/10.35707/9789587543605>

Dirección editorial: Ediciones Unibagué
ediciones.unibague.edu.co
publicaciones@unibague.edu.co
Universidad de Ibagué
Carrera 22, calle 67. Barrio Ambalá
Teléfono: +57 (8) 2760010
Ibagué, Tolima, Colombia.
www.unibague.edu.co

Foto de portada: *Chaetocercus mulsant* - Jorge E. Garcia Melo

Diseño, diagramación e impresión
León Gráficas S.A.S PBX 2630088. Ibagué

Participantes

Autores principales: Concibieron y ejecutaron el proyecto, hicieron la revisión, modificación y edición de la información presentada en las fichas y los textos generales, elaboración de mapas, dieta, revisión fotográfica, grabación, edición y depósito de cantos, así como todas las demás acciones involucradas en la construcción de este libro.

Yair Guillermo Molina Martínez. Biólogo y magíster en Ciencias Biológicas de la Universidad del Tolima, doctor en Ecología y Evolución de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Docente tiempo completo de la Universidad de Ibagué, adscrito al programa de Biología Ambiental. Ornólogo con más de 20 años de experiencia, miembro fundador y actualmente vicepresidente de la junta directiva de la Asociación Tolimense de Ornitología (Anthocephala), e igualmente, ocupa el cargo de tesorero de la Asociación Colombiana de Ornitología.

Miguel Moreno Palacios. Biólogo y magíster en Ciencias Biológicas de la Universidad del Tolima, candidato a doctor en Ciencias, mención Biología de la Universidad de los Andes. Docente tiempo completo de la Universidad de Ibagué, adscrito al programa de Biología Ambiental. Ornólogo con más de 15 años de experiencia. Es miembro de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Ornitología, donde actúa como su presidente.

Autores de fichas: Corresponde a las personas vinculadas a alguna de las reservas adscritas a RedNatur que asistieron al curso de avistamiento. Adicionalmente, participaron los miembros del grupo de apoyo del proyecto y los autores principales, quienes elaboraron los textos de cada ficha, a partir de la recopilación de información en campo y en bibliografía especializada. Son ellos Ángela Merchán, Beatriz Méndez Cubillos, Carlos Alfonso Guevara Colmenares, Diba Andrade, Diego Carantón-Ayala, Gissela Sánchez Castiblanco, Jenniffer Andrea Domínguez Vargas, José Sosa Salgado, Jorge Arturo Romero Barrera, Jovany Celemín, Juan Felipe del Castillo Téllez, Juan

Manuel Currea, Lina Martínez, Lucelia Triana Sánchez, Marta Lucía Arbeláez, Miguel Moreno Palacios, Nicolás Vargas Sánchez, Orlan David Vargas Díaz, Patricia Hurtado Vargas, Rossmayra Marulanda Bejarano, Santiago Vargas Sánchez, Teresa Castiblanco Leal, Yair Guillermo Molina Martínez, Yolanda Mosos Angarita

Autores de fotografías: Se refiere a los colaboradores del proyecto —participantes de las reservas RedNatur, miembros del grupo de apoyo y autores principales— quienes, en la fase de ejecución del proyecto, tomaron las fotografías de las especies para las fichas. Además, algunos fotógrafos profesionales y aficionados fueron invitados a contribuir con sus fotos de varias especies faltantes: Carlos Alfonso Guevara Colmenares, David Sánchez, Gissela Sánchez Castiblanco, Luis Eduardo Urueña, Jorge García Melo, Jeyson Sana-bria-Mejía, Jorge Arturo Romero Barrera, José Sosa Salgado, Miguel Moreno Palacios, Nicolás Vargas Sánchez, Rossmayra Marulanda Bejarano, Santiago Vargas Sánchez, Teresa Castiblanco.

Entidades participantes

Universidad de Ibagué (Ejecutor); Red Turismo de Naturaleza del Tolima Rednatur. (Participantes): Entreaguas Reserva Agroecoturística, Finca Paraíso del Cocora, Posada Turística Kenisha, Reserva Natural Agua Fría, Reserva Natural Gaia, Reserva Natural La Primavera, Reserva Natural Orquídeas del Tolima, SPA Ambiental Los Alpes, Reserva La Carpintería. Colciencias (Financiador).

Contenido

Participantes	3
Presentación	11
Introducción	15
¿Cómo se construyó este libro?	17
¿Como utilizar este libro?	19
Guía de lectura:.....	19
Palabras claves en la descripción de las especies.....	20
Cuerpo	20
Cabeza.....	21
Fichas de especies	22
Tinamidae.....	21
<i>Crypturellus soui</i>	22
Cracidae	24
<i>Ortalis columbiana</i>	25
Columbidae.....	26
<i>Leptotila verreauxi</i>	27
<i>Leptotila conoveri</i>	28
<i>Zenaida auriculata</i>	29
<i>Claravis pretiosa</i>	30
<i>Columbina talpacoti</i>	31
Cuculidae	32
<i>Crotophaga ani</i>	33
<i>Piaya cayana</i>	34
Steatornithidae.....	35
<i>Steatornis caripensis</i>	36

Trochilidae	37
<i>Florisuga mellivora</i>	38
<i>Eutoxeres aquila</i>	39
<i>Glaucis hirsutus</i>	40
<i>Phaethornis guy</i>	41
<i>Phaethornis symrnatophorus</i>	42
<i>Anthracothonax nigricollis</i>	43
<i>Anthocephala berlepschi</i>	44
<i>Coeligena coeligena</i>	45
<i>Coeligena torquata</i>	46
<i>Ensifera ensifera</i>	47
<i>Chlorostibon gibsoni</i>	48
<i>Chalybura buffonii</i>	49
<i>Thalurania colombica</i>	50
<i>Saucerotia cyanifrons</i>	51
<i>Amazilia tzacatl</i>	52
<i>Uranomitra franciae</i>	53
Rallidae	54
<i>Aramides cajaneus</i>	55
Charadriidae	56
<i>Vanellus chilensis</i>	57
Ardeidae.....	58
<i>Bubulcus ibis</i>	59
<i>Ardea alba</i>	60
Threskiornithidae	61
<i>Phimosus infuscatus</i>	62
Cathartidae	63
<i>Coragyps atratus</i>	64
<i>Cathartes aura</i>	65
Accipitridae.....	66
<i>Rupornis magnirostris</i>	67
Momotidae	68
<i>Momotus aequatorialis</i>	69
Alcedinidae	70
<i>Chloroceryle amazona</i>	71
<i>Chloroceryle americana</i>	72

Galbulidae.....	73
<i>Galbula ruficauda</i>	74
Bucconidae	75
<i>Malacoptila mystacalis</i>	76
Ramphastidae.....	77
<i>Aulacorhynchus prasinus</i>	78
<i>Aulacorhynchus haematopygus</i>	79
<i>Andigena nigrirostris</i>	80
Picidae.....	81
<i>Picumnus olivaceus</i>	82
<i>Melanerpes rubricapillus</i>	83
<i>Dryocopus lineatus</i>	84
<i>Colaptes punctigula</i>	85
Falconidae	86
<i>Caracara Cheriway</i>	87
<i>Milvago chimachima</i>	88
Psittacidae.....	89
<i>Brotogeris jugularis</i>	90
<i>Forpus conspicillatus</i>	91
<i>Psittacara wagleri</i>	92
Thamnophilidae.....	93
<i>Thamnophilus multistriatus</i>	94
<i>Dysithamnus mentalis</i>	95
<i>Myrmeciza longipes</i>	96
Grallariidae	97
<i>Grallaria ruficapilla</i>	98
<i>Grallaria nuchalis</i>	99
<i>Grallaria milleri</i>	100
Rhinocryptidae	101
<i>Scytalopus atratus</i>	102
Furnariidae	103
<i>Dendrocincla fuliginosa</i>	104
<i>Dendrocolaptes picumnus</i>	105
<i>Dendroplex picus</i>	106

<i>Campylorhamphus trochilirostris</i>	107
<i>Lepidocolaptes souleyetii</i>	108
<i>Lochmias nematura</i>	109
<i>Automolus ochrolaemus</i>	110
<i>Synallaxis brachyura</i>	111
<i>Synallaxis albescens</i>	112
Pipridae	113
<i>Chiroxiphia lanceolata</i>	114
<i>Manacus manacus</i>	115
Tityridae	116
<i>Pachyramphus rufus</i>	117
Tyrannidae	118
<i>Mionectes oleagineus</i>	119
<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	120
<i>Lophotriccus pileatus</i>	121
<i>Todirostrum cinereum</i>	122
<i>Zimmerius chrysops</i>	123
<i>Tyrannulus elatus</i>	124
<i>Myiopagis viridicata</i>	125
<i>Phyllomyias griseiceps</i>	126
<i>Phaeomyias murina</i>	127
<i>Legatus leucophaius</i>	128
<i>Myiodynastes maculatus</i>	129
<i>Myiozetetes cayanensis</i>	130
<i>Tyrannus melancholicus</i>	131
<i>Myiarchus apicalis</i>	132
<i>Pyrocephalus rubinus</i>	133
<i>Sayornis nigricans</i>	134
Vireonidae	135
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	136
<i>Hylophilus flavipes</i>	137
Corvidae	138
<i>Cyanolyca armillata</i>	139
<i>Cyanocorax affinis</i>	140
<i>Cyanocorax yncas</i>	141

Troglodytidae	142
<i>Troglodytes aedon</i>	143
<i>Pheugopedius fasciatoventris</i>	144
<i>Pheugopedius mystacalis</i>	145
<i>Henicorhina leucophrys</i>	146
<i>Henicorhina leucosticta</i>	147
Turdidae	148
<i>Turdus leucomelas</i>	149
Fringillidae	150
<i>Euphonia concinna</i>	151
<i>Euphonia laniirostris</i>	152
<i>Chlorophonia cyanea</i>	153
<i>Chlorophonia pyrrhophrys</i>	154
Rhodinocichlidae	155
<i>Rhodinocichla rosea</i>	156
Passerellidae	157
<i>Arremon aurantirostris</i>	158
<i>Zonotrichia capensis</i>	159
<i>Atlapetes flaviceps</i>	160
Icteridae	161
<i>Psarocolius decumanus</i>	162
<i>Cacicus chrysonotus</i>	163
Parulidae	164
<i>Myiothlypis fulvicauda</i>	165
<i>Basileuterus rufifrons</i>	166
Cardinalidae	167
<i>Habia cristata</i>	168
<i>Cyanoloxia cyanoides</i>	169
Thraupidae	170
<i>Catamblyrhynchus diadema</i>	171
<i>Chlorophanes spiza</i>	172
<i>Sicalis flaveola</i>	173
<i>Diglossa albilatera</i>	174
<i>Diglossa cyanea</i>	175

<i>Volatinia jacarina</i>	176
<i>Loriotus luctuosus</i>	177
<i>Eucometis penicillata</i>	178
<i>Ramphocelus dimidiatus</i>	179
<i>Dacnis lineata</i>	180
<i>Sporophila intermedia</i>	181
<i>Sporophila nigricollis</i>	182
<i>Saltator maximus</i>	183
<i>Saltator coerulescens</i>	184
<i>Saltator striatipectus</i>	185
<i>Coereba flaveola</i>	186
<i>Tiaris olivaceus</i>	187
<i>Melanospiza bicolor</i>	188
<i>Chlorornis riefferii</i>	189
<i>Stilpnia vitriolina</i>	190
<i>Tangara nigroviridis</i>	191
<i>Tangara labradorides</i>	192
<i>Tangara gyrola</i>	193
<i>Thraupis episcopus</i>	194
<i>Thraupis palmarum</i>	195
Referencias	196
Listado de chequeo de las aves del municipio de Ibagué	198



Presentación

El presente libro hace parte de uno de los resultados del proyecto de investigación “Estudio técnico y participativo de la biodiversidad aviar del municipio de Ibagué, Tolima, como estrategia para la consolidación del ecoturismo de aves, la conservación de sus hábitats y el desarrollo de procesos de educación ambiental”, el cual fue escogido para ser financiado entre diferentes iniciativas que participaron en la convocatoria de Colciencias: Ideas para el cambio 2016.

El proyecto tenía como fin promover el desarrollo de economías locales basadas en el avistamiento de aves, teniendo como foco la organización comunitaria de dueños de reservas, denominadas Rednatur. Para este fin, se llevaron a cabo exploraciones de caracterización de la avifauna en 10 reservas de la sociedad civil de la organización y dos reservas protectoras de Cortolima. Adicionalmente, durante seis meses se capacitaron a 34 personas en el avistamiento técnico de aves y principios básicos para ser guía de aviturismo, capacitación que fue apoyada con la entrega de dos binoculares a cada reserva.

A medida que avanzaba el curso, los participantes de esta capacitación fueron preparados para llevar a cabo observaciones y registro de la historia de vida de las aves de sus predios, a manera de investigación participativa. Adicionalmente, estas personas participaron activamente en los monitoreos técnicos, ayudando a diferentes tareas como la observación y registro de individuos, sujeción y manipulación de especímenes. Como resultado se registró un total de 356 especies y 12 010 individuos de aves, destacando la presencia de 10 especies endémicas, 27 casi endémicas, 24 migratorias y nueve con alguna categoría de amenaza de extinción.

Adicionalmente, durante el proyecto, las personas formadas realizaron la construcción de 108 fichas de observaciones de historia de vida de diferentes especies y colaboraron en la elaboración de fichas técnicas de esta guía de aves, incluyendo sus fotografías. Por otra parte, dentro del proceso de promoción y educación



ambiental del avistamiento de aves se llevaron a cabo 50 talleres con una duración de cuatro horas en las diferentes reservas, generando procesos de sensibilización ambiental en 800 niños de instituciones educativas de escuelas rurales y urbanas del municipio de Ibagué; además de cerca de 100 adultos de las áreas aledañas de las reservas. En total se orientaron talleres a más de 1000 personas, en los que se incluyen otros talleres adicionales que desarrollaron los participantes del equipo ejecutor en los colegios de la ciudad.

Con toda la información recolectada se diseñaron, para cada reserva, los folletos de servicio y productos verdes, así como la caracterización de la oferta aviturística como un producto a ofrecer. Adicionalmente, se diseñaron dos rutas de avistamiento para la organización Rednatur, con el primer producto de servicio aviturístico a ser ofertado en la ciudad. Durante los siguientes tres años, varios miembros del proceso contribuyeron y fueron socios fundadores de la Asociación Tolimense de Ornitología, la cual se encuentra en la actualidad posicionada como una organización enmarcada en el estudio, conservación de las aves del departamento del Tolima y el desarrollo de procesos de educación ambiental.

Resultado de esto es la participación constante de Rednatur y varios de sus socios en actividades de educación ambiental para la conservación de las águilas cuasmesas, censos navideños, censos de aves acuáticas y el *global big day*, actividades anuales que han recibido el apoyo de instituciones como Cortolima, la Alcaldía de Ibagué y la Cámara de Comercio de Ibagué. Igualmente, estos miembros han participado en diversos escenarios, ferias de aviturismo y festivales de aves, incluso como organizadores en los tres últimos festivales de aves del Tolima.

Actualmente, varios participantes de este proyecto cuentan con estrategias de rutas de avistamiento y han consolidado su producto; algunos miembros formados se han convertido en guías especializados en aviturismo, que han continuado su proceso al obtener sus licencias como guías de turismo con el SENA y, últimamente, en capacitación en guianza aviturística con Audubon.



Los procesos de educación ambiental conllevaron a la formación del grupo de observadores de aves rural Cristata de la reserva Entreaguas, el cual lleva dos años activo, formando personas conscientes del ambiente y guías de avistamiento para el futuro. Podría decirse que este proyecto promovió fuertemente el desarrollo de las propuestas actuales de aviturismo en el Municipio y el Departamento.

Este libro es el resultado de un proceso participativo, que tiene como fin contribuir al avistamiento de aves, los procesos de aviturismo local y educación ambiental en el municipio de Ibagué y el Tolima.

Finalmente, como un aporte a la conservación y la promoción de la observación de las aves, se anexa al final de este libro, la lista de chequeo de las 675 especies de aves reportadas para el municipio de Ibagué por Parra & Molina (2021).





Introducción

Colombia es el país con mayor diversidad de aves del mundo. Con un número cercano a las 1954 especies, resguarda el 57 % de las especies de suramérica y cerca del 18 % del planeta (Clements et al., 2019; ACO 2020; Remsen et al., 2020). Por sí sola, toda esta diversidad amerita su conservación, atención y estudio; no obstante, en la actualidad existen unas 170 especies amenazadas de extinción, incluyendo una ya extinta (Renjifo et al., 2014).

El municipio de Ibagué cuenta con una amplia variación altitudinal, la cual va desde los 200 hasta los 5215 m s. n. m., permitiendo la formación de diferentes zonas de vida, desde los bosques secos de la parte baja en la meseta de Ibagué, mezclados con pastizales, matorrales, humedales entre mosaicos de cultivos, hasta los bosques húmedos, pluviales y páramos en las zonas altas, en las cadenas de montañas del norte y sur del municipio. Esta amplia variación de pisos térmicos, zonas de vida y hábitat han promovido una alta diversidad de aves, las cuales, hasta el momento, alcanzan las 675 especies (Parra et al., 2007; Molina-Martínez, 2014; Parra & Molina en revisión).

Desde hace más de 20 años, en el Tolima, y en particular el municipio de Ibagué, se han venido realizando caracterizaciones de la avifauna en diferentes proyectos de ordenación de cuencas, proyectos de investigación y trabajos de grado de diferentes universidades regionales, ornitólogos, expertos y aficionados. Estas y otras iniciativas han producido diferentes publicaciones que, a mediano plazo, han llamado la atención de avistadores de aves locales y extranjeros, permitiendo disparar el potencial turístico de la región. En particular a nivel nacional, uno de los sitios más visitados por extranjeros para avistar aves es el cañón del Combeima dentro del municipio de Ibagué (Ocampo-Peñuela & Winton, 2017); bajo esta perspectiva, la actividad del aviturismo en el municipio requiere ser desarrollada como una actividad lucrativa.



A nivel mundial, el turismo de observación de aves ha venido adquiriendo cada vez más adeptos (Cordell & Super, 2000; Conradie & van Zyl, 2013; Steve et al., 2015), se estima que solo para los Estados Unidos al año existen más de 45 millones de personas que ven o fotografían aves. El mercado del turismo de aves es uno de los negocios multimillonarios más grandes en Europa y Norte América, con destinos de observación no solo a nivel local sino en todo el mundo (Welford & Barilla, 2013). En países neotropicales, donde se encuentran altos valores de diversidad de especies, el potencial del mercado del aviturismo es enorme (Puhakka et al., 2011; Welford & Barilla, 2013), sin contar que el aviturismo puede ser una estrategia de desarrollo sostenible y de conservación de las aves y sus hábitats (Hvenegaard & Dearden, 1998; Steven et al., 2013). La belleza paisajista, la variedad de hábitats, la alta riqueza de aves y alto número de especies de interés para la conservación, convierten al municipio de Ibagué en un destino potencialmente importante para el aviturismo (Puhakka et al., 2011; Steven et al., 2015).

Algunas de las principales necesidades para el desarrollo de un producto de avistamiento es el establecimiento del listado especies, contar con guías locales especializados, seguridad y buenas prácticas de atención y servicio de alimentación y hospedaje. Igualmente, es importante contar con guías de campo o de identificación de aves locales, que faciliten el reconocimiento de las especies y la ubicación de los sitios de observación, las cuales contribuyan a la formación de guías, aficionados y sean herramientas para la difusión de la observación de aves como actividad de esparcimiento, la promoción de procesos de sensibilización y educación ambiental.

El presente libro compila las descripciones e información ecológica, fotografías, cantos y mapas de presencia municipal de 136 especies de aves registradas en el municipio de Ibagué, entre comunes, endémicas y de interés para el aviturismo y la conservación. Esperamos que este libro contribuya para consolidar iniciativas locales de avistamiento de aves, educación ambiental y conservación de aves del municipio; y, en particular, sea usado por las reservas de Rednatura, los actores y participantes del proyecto.



¿Cómo se construyó este libro?


Los participantes del curso de observación técnico de aves del proyecto realizaron registros y observaciones en campo, consultaron diferentes fuentes bibliográficas, principalmente Hilty y Brown (1986) y Ayerbe-Quiñones (2018), en cuanto a rangos altitudinales, algunas medidas y aspectos generales; todo con el fin de escribir las diferentes fichas de descripción de las especies de aves incluidas en este libro. La información relatada en los formatos de historia de vida de especies de aves, resultado del proceso de investigación participativa, también fue tomada en cuenta y anexada en las fichas.

Los autores principales realizaron edición, validación y corrección de la información contenida en cada una de las fichas, y en algunos casos se complementó o se adicionó la información. Se recopilaron, seleccionaron y validaron las fotografías de las diferentes especies de aves entre los participantes del proyecto. En el transcurso del proyecto, y otros desarrollados por los autores, se grabaron la mayoría de los cantos de cada una de las especies, los cuales fueron incluidos en la colección de cantos en línea Xeno-canto (<https://www.xeno-canto.org/>).

Basados en los datos de presencia de cada especie de ave en las diferentes localidades del proyecto y las principales localidades de avistamiento dentro del municipio (Parra et al., 2007), se elaboraron los mapas para cada especie. En general, las reservas de Red-natur, en las cuales se desarrolló el proyecto, se ubican entre los 950 y 1550 m s. n. m., principalmente entre el bosque seco tropical y el bosque muy húmedo premontano; las otras dos localidades del proyecto incluyeron importantes reservas protectoras forestales (Bellavista y el Palmar), ubicadas entre los 1800 y 4000 m s. n. m., las cuales abarcan las zonas de vida bosque muy húmedo premontano, bosque húmedo montano bajo, bosque muy húmedo montano bajo. Estas reservas no son solo importantes en la conservación de especies, al mantener considerables áreas de bosque natural, sino que, además, protegen las cuencas de varios afluentes que surten a

varios acueductos. Con el fin de presentar sitios de avistamiento de aves en todo el municipio de Ibagué, se incluyeron en estos mapas un total de 44 localidades (ver figura 1).

Figura 1. Ubicación de las localidades del proyecto¹



Fuente: Miguel Moreno Palacios

¹ Ubicación de las localidades con registros de especies de aves incluidas en esta guía. En verde se presentan las reservas naturales asociadas a la Red de Turismo de Naturaleza del Tolima RedNatur; en amarillo se resaltan las reservas protectoras de Cortolima; en rojo se muestran otras localidades estudiadas por Parra et al. (2007). 1. RN Agua Fria, 2. Reserva Agroturística Entre Aguas, 3. RN Gaia, 4. Posada turística Kenisha, 5. RN La Carpintería, 6. Spa Ambiental Los Alpes, 7. RN La Lucía, 8. RN La Primavera, 9. RN Orquídeas del Tolima, 10. RN Paraíso del Cocora, 11. Reserva Forestal Protectora El Palmar, 12. Reserva Forestal Protectora Regional Bella Vista, 13. Barrio Villa Café, 14. Jardín Botánico Alejandro von Humboldt-UT, 15. Cañón quebrada Las Perlas (parte alta), 16. Corregimiento de Villa Restrepo, 17. Corregimiento de Juntas, 18. Jardín Botánico San Jorge y alrededores, 19. Clarita Botero (vereda Ancón-Tesorito), 20. Laguna Venta Quemada, 21. Cerro de La Martinica, 22. Corregimiento de Dantas, 23. Complejo Lagunar Picaleña, 24. Complejo Lagunar El Salado, 25. Corregimiento de Doima (Municipio de Piedras), 26. El Rancho, 27. Calambeo, 28. Complejo Lagunar El Toro, 29. Corregimiento de El Totumo, 30. Quebrada Barbona, 31. Corregimiento de Gualanday (Municipio de Coello), 32. Alrededores del Aeropuerto Perales, 33. Mina del Vergel, 34. Montaña Mágica, 35. Corregimiento de Cay, 36. Corregimiento de Toche, 37. La Cueva (Ruta nevado del Tolima), 38. Zona Urbana de Ibagué, 39. Vereda Chucuní, 40. Cañón quebrada Las Perlas (parte baja), 41. Vereda Llanitos, 42. Vereda Pastales, 43. Clarita Botero (Ancón-Tesorito) Parte alta, 44. Quebrada Ambalá Parte Alta.

¿Como utilizar este libro?

1 Familia **Tinamidae**

Familia exclusivamente de aves neotropicales, curiosamente es una de las familias más antiguas del nuevo mundo, son aves comedoras de vuelo corto, silenciosas y se camuflan fácilmente en la hojarasca debido a su plumaje en tonos marrones y grisáceos, usualmente con estrías y escamas. Poseen un tamaño de pequeño a mediano con cola corta y cuello largo, las hembras ponen huevos en tonos rosa, verde y azul, su alimentación se basa en bayas e insectos.

2 Descripción:

El tinamou chico es un pequeño ave de las especies de tinamou, es originario de Colombia, tiene un tamaño pequeño, su plumaje es marrón, gris y blanco, su pico es corto y fuerte, sus patas son débiles y sus alas son pequeñas.

3 Categoría de amenaza (según Renjifo et al., 2014).

4 Nombre vulgar de la especie.

5 Nombre estandarizado en inglés de la especie.

6 Nombre científico de la especie.

7 Mapa de ubicación de la especie en el municipio de Ibagué.

8 Etimología:

El nombre *Crypturellus* es un diminutivo del género *Crypturus* que significa "oculto" o "secreto", y *souli* es un sufijo que se le agrega a las palabras para indicar que son de la familia *Crypturellidae*.

9 Código QR que direcciona a la página web de registro del canto de la especie, principalmente en la base de datos Xeno-canto, en donde la persona puede acceder y escuchar el canto.

10 Descripción básica de la especie.

11 Aspectos ecológicos:

Es una especie que vive en el suelo y se alimenta de bayas, frutos, insectos y algunas semillas. Es una especie que vive en el suelo y se alimenta de bayas, frutos, insectos y algunas semillas. Es una especie que vive en el suelo y se alimenta de bayas, frutos, insectos y algunas semillas.

22 Ver Galdames-Palacio, Martínez - Páez, Ríos, Palacios

23 Ibagué, entre alas, colores y cantos

Guía de lectura:

1. Familia: antes de una ficha de especie se encuentra la familia a la cual pertenece esta o las demás especies, organizadas de acuerdo con el orden filogenético (siguiendo a Remsen et al., 2020). Esta parte consta del nombre de la familia, una descripción básica y una foto de un espécimen representativo.
2. Ficha de especie: ilustra, de primera entrada, una fotografía representativa de la especie.
3. Categoría de amenaza (según Renjifo et al., 2014).
4. Nombre vulgar de la especie.
5. Nombre estandarizado en inglés de la especie.
6. Nombre científico de la especie.
7. Mapa de ubicación de la especie en el municipio de Ibagué.
8. Etimología: hace referencia al significado del género y la especie.
9. Código QR que direcciona a la página web de registro del canto de la especie, principalmente en la base de datos Xeno-canto, en donde la persona puede acceder y escuchar el canto.
10. Descripción básica de la especie.
11. Aspectos ecológicos de la especie, en particular las conocidas en el área de estudio: esta incluye la distribución altitudinal,




hábitats de encuentro, dieta básica y algunos tipos de comportamiento y características específicas y disponibles de la historia de vida de la especie (e.g. características de nido y huevos, organización social, etc.).

Palabras claves en la descripción de las especies

Cuerpo

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| 1. Corona | 9. Flancos |
| 2. Frente | 10. Tarso |
| 3. Pico | 11. Tibia |
| 4. Garganta | 12. Rectrices o Cauda |
| 5. Área malar | 13. Coberteras supracaudales |
| 6. Área auricular | 14. Rabadilla |
| 7. Pecho | 15. Espalda o manto |
| 8. Dedos. | 16. Nuca |




Fuente: Yair G. Molina-Martínez



Cabeza

1. Nuca
2. Coronilla
3. Ceja o lista superciliar
4. Lista ocular o lista a través del ojo
5. Frente
6. Maxila
7. Mandíbula
8. Mentón o barbilla
9. Lore
10. Bigotera
11. Área auricular
12. Garganta



Fuente: Yair G Molina-Martínez

Fichas de especies

Tinamidae

Familia exclusivamente de aves neotropicales, curiosamente es una de las familias más antiguas del nuevo mundo, son aves corredoras de vuelo corto, silenciosas y se camuflan fácilmente en la hojarasca debido a su plumaje en tonos marrones y grisáceos, usualmente con estrías y escamas. Poseen un tamaño de pequeño a mediano con cola corta y cuello largo, las hembras ponen huevos en tonos rosa, verde y azul, su alimentación se basa en bayas e insectos.




Crypturellus soui - Foto: Jeyson Sanabria Mejía

Tinamú chico

Little tinamou

Crypturellus soui



Autor de la ficha: Juan Felipe del Castillo Téllez.

Foto: Jeyson Sanabria Mejía

Etimología:

El nombre *Crypturellus* es un diminutivo del género *Crypturus* que proviene del griego *kruptos* referido a oculto y *soui* proviene de la lengua Caribe, que es el nombre que los indígenas le tienen a esta especie.

Aspectos ecológicos:

Especie muy vocal, pero es difícil de ver en sotobosque denso oscuro y matorrales del bosque seco, por sus colores crípticos y por su hábitat. Se alimenta de semillas, frutos, insectos y algunos vertebrados. Ave terrestre que suele verse caminando de manera lenta y tímida, que al darse cuenta de la presencia del hombre, corre y huye despavorida hacia el matorral.



Descripción:

Es una de las especies de tinamou más pequeñas de Colombia. Presenta una coronilla gris azulado oscura, al igual que los auriculares, lados de la cabeza y parte de la nuca; con pico negro y el resto de las partes superiores de color café grisáceo oscuro a rufo. La garganta es blanquecina con todas sus partes inferiores de café rojizo, pero el pecho es más oscuro. Las patas son de color amarillo oscuro.



Insectívoro



Granívoro



Frugívoro

Alimentación

Cracidae

Esta incluye aves como paujiles y pavas, aves tropicales del sur y centro América. Cabeza pequeña o mediana en relación con su cuerpo, generalmente cola larga, cuentan con un plumaje usualmente oscuro; sin embargo, presentan colores vistosos en la cabeza o cuello, se alimentan de insectos o frutas.




Crax alberti - Foto: Miguel Moreno Palacios



Guacharaca colombiana

Colombian chachalaca

Ortalis columbiana



Autor de la ficha: Jorge Arturo Romero Barrera.

Foto: Jorge García Melo

Etimología:

La palabra *Ortalis* derivada de la palabra griega *ortális* que hace referencia a similar a un pollo. El epíteto *Columbiana* hace referencia a Colombia, de donde es endémica.

Descripción:

El pico de color gris azulado, ojos café oscuro; cabeza grisácea, garganta hasta pecho bajo, escamado de café grisáceo con bordes blancuzcos. Los restos por debajo son café grisáceo claro, cola café rufa larga y sus patas son de color rosado piel.

Aspectos ecológicos:

Es una especie frecuente en muchas áreas arboladas y bordes de bosque; usualmente en grupos de tres a cinco individuos, no obstante, en grandes árboles con frutos pueden llegar a más de 50. Principalmente frugívora arbórea, consumiendo frutos de lauráceas, yarumos e, incluso, guayabas. Cuando percibe la presencia humana es bastante escandalosa y furtiva, desplazándose de árbol en árbol por el dosel.



Alimentación

Columbidae

Esta familia incluye tórtolas y palomas; tiene una amplia distribución por todo el mundo, poseen un cuerpo robusto, cuello corto, pico pequeño, patas cortas, alas grandes y fuertes. Cabe destacar que se ha demostrado que es una de las familias más inteligentes del grupo de las aves, poseen un gran sentido de orientación y una aguda vista.




Leptotila verreauxi - Foto: Jeyson Sanabria Mejía

Caminera rabiblanca

White-tipped Dove

Leptotila verreauxi



Autor de la ficha: Jorge Arturo Romero Barrera.

Foto: José Sosa

Etimología:

Leptotila proviene de las raíces griegas *leptós* y *ptílon*, refiriéndose a que tiene alas delgadas. El epíteto *verreauxi*, se da en honor de los hermanos naturalistas de origen francés Jean y Jules Verreaux.

Aspectos ecológicos:

Muy asustadiza, se observa principalmente caminando furtiva en el suelo en medio de matorral o en sotobosque, principalmente en el interior del bosque o en el borde; también en el cafetal u otros cultivos como el del aguacate. Se escucha principalmente, desde estratos bajos con su típico canto en un tono de frecuencia bajo de una nota larga al mismo nivel de frecuencia. Puede llegar a comederos de granos.



Descripción:

Posee un pico de color negro, ojos anaranjado rojizo y piel facial desnuda alrededor del ojo de color azul; su frente blancuzca y demás partes de la cabeza hasta los lados del cuello y pecho son de color rosa lavado, con escamado rosa verdoso en la nuca. En el pecho bajo y abdomen poseen un tono blanco inmaculado, el dorso es de color café oliva oscuro junto con las alas y cola. Esta última presenta las plumas externas con amplios bordes blancos.




Alimentación

Caminera tolimense

Tolima Dove

Leptotila conoveri



Autor de la ficha: José Sosa Salgado.

Foto: Miguel Moreno Palacios

Etimología:

La palabra *Leptotila* proviene de las raíces griegas *leptos* y *ptilon* que significa de plumas finas. La especie *conoveri* fue dada en honor al ornitólogo norteamericano, Henry Boardman Conover.

Aspectos ecológicos:

Frecuente en el municipio, principalmente en el área rural, sobre todo asociada a cultivos de café, bosques y bordes. Aunque existen sitios en donde se puede observar con facilidad porque se expone en áreas abiertas; usualmente no se ve con frecuencia, a no ser que se detecte por su canto que asemeja un *uuuUUUuuu*, más común en temporada reproductiva, escuchándose desde muy temprano hasta cerca de las 10:00 a.m. y, por la tarde, después de las 4:00 p.m. Particularmente en la R. N. Gaia, se ha observado consumiendo semillas de *Bocconia frutescens* (Trompeto), el *Oreopanax incisus* (Mano de oso), *Miconia sp.* (punta de lanza), semillas de pastos, invertebrados y frutillas.

Descripción:

El pico es corto de color negro, la cabeza en la corona presenta una coloración gris claro azulosa, con la nuca y costados del cuello de café rojizo a un café violáceo hacia la parte terminal de la nuca, en forma de un collar difuso extendido hasta el pecho. Los ojos grandes amarillo crema, garganta blancuzca, pecho café rojizo y abdomen café claro; las alas grandes color café marrón, al igual que la cola. Las plumas debajo de la cola presentan una terminación blanca. Las patas son de color rojo.



Vulnerable



Endémico



Granivoro




Frugívoro

Alimentación

Tórtola

Eared Dove

Zenaida auriculata



Autor de la ficha: Jeniffer Andrea Domínguez Vargas.

Foto: José Sosa

Etimología:

El nombre *Zenaida* se estableció en honor a Zénaïde Laetitia Julie Princesse Bonaparte, esposa del ornitólogo francés Prince Bonaparte. El epíteto *auriculata* deriva de la raíz latinas *auriculatus* para referirse a que tiene una oreja, tal y como lo muestra la especie.

Descripción:

Tiene dimorfismo sexual, pero en general el cuerpo es café claro rojizo a café oliva oscuro en las alas; las hembras son más oscuras y sin tonalidades diferentes, los machos poseen una coloración azulada en la parte superior de la cabeza, con dos franjas azul violáceo negruzco al lado del auricular, que de lejos parece una oreja. El dorso es oscuro con reflejos metalizados en el cuello y manchas azul violáceo negruzco en las alas; la parte del pecho tiene una tonalidad rosácea oscura. Cuando vemos el ave en vuelo podemos observar una mancha blanca o café rojiza en la punta de la cola; las patas son cortas y rosadas.

Aspectos ecológicos:

Forrajea la mayor parte del tiempo en el suelo; anida generalmente en un arbusto o árbol no muy alto, con nidos de canasta contruidos de fibras de pasto o artificiales; a finales de la temporada reproductiva es común ver pichones caídos en suelo o aprendiendo a volar. Los machos elaboran un canto peculiar de baja frecuencia gutural que consta de cuatro notas, la primera y la última más largas como si dijeran UUUGGrrrr--Grrrr-grrrr--Grrrrrrrr.



Granívoro




Frugívoro

Alimentación

Tortolita azul

Blue Ground - Dove

Claravis pretiosa



Autor de la ficha: José Sosa Salgado.

Foto: Miguel Moreno Palacios

Etimología:

Su nombre *Claravis* deriva de las raíces latinas *clarus* y *avis*, refiriéndose a ave clara. Su epíteto *pretiosa* proviene del latín *pretiosus*, que significa precioso.

Aspectos ecológicos:

La tortolita azul del municipio de Ibagué es típica de bosque seco y sus bordes, no obstante, en el último año ha realizado migraciones altitudinales a algunos bosques húmedos por encima de los 1300 m. En la Reserva Natural de la Sociedad Civil, RNSC, Gaia se registró por primera vez entre mayo y octubre de 2017. Se sabe que consume insectos del suelo y semillas caídas.



Descripción:

Como todas las palomas, tiene un pico corto para su tamaño, un poco curvo y débil, razón por la cual solo recoge el alimento. Presenta dimorfismo sexual. El macho es de color gris azulado claro con degradaciones de claro a muy claro, según la iluminación a que se exponga, siendo su pecho al sol más blanco que azul. La espalda y alas más oscuras, con varias manchas negruzcas contrastantes en las alas. La hembra es similar al macho, pero con una coloración canela claro, más oscura en espalda y alas con manchas cafés oscuro en estas últimas.




Granívoro



Frugívoro

Alimentación

Tortolita o abuelita Ruddy Ground Dove *Columbina talpacoti*



Autor de la ficha: Yair Guillermo Molina Martínez.

Foto: Miguel Moreno Palacios

Etimología:

El género *Columbina* se deriva de la palabra latina *columbinus*, la cual hace referencia a que es similar a una paloma; el epíteto *talpacoti* no tiene un significado aparente.

Aspectos ecológicos:

Especie común en zonas secas, rastrojos y áreas abiertas, o arbolado disperso, al igual que dentro de la ciudad, en parques y jardines, hasta 2500 m s. n. m. Es una especie confiada, fácil de observar, percheda en las cuerdas de la luz o caminando en el suelo, raspando en busca de pequeñas semillas, pequeños insectos y otros macroinvertebrados; usualmente en parejas o grupos de diferentes tamaños, siendo muy abundantes en las ciudades, sobre todo sitios en donde se acostumbran fácilmente a ser alimentados por el hombre.



Descripción:

Similar a una paloma, pero de mucho menor tamaño y con dimorfismo sexual. El macho en general es de color marrón, más oscuro por encima, con la corona y nuca gris azulado y el resto de las partes de la cabeza de marrón claro a blancuzco; dos barras punteadas en coberteras y tres más gruesas en alas de color azul violáceo oscuro casi negro. La hembra, en general, es café grisáceo con el abdomen blancuzco, cola más café rojiza y el mismo patrón de barras que el macho. Las patas son cortas y rosadas, al igual que colas cortas en ambos sexos.



Alimentación

Cuculidae

Dentro de esta familia se encuentran los cucus, garrapateros y correcaminos; aves alargadas, de pico mediano y ligeramente curvo, alas y colas largas y graduadas. Usualmente de plumajes en coloraciones castaños, grisáceos y negros azulados. La mayoría de las especies son parásitas de nido, es decir, que depositan sus huevos en el nido de otras especies de aves, donde los padres adoptivos los incuban y crían como si fueran su propia cría. Por lo general, se alimentan de insectos y frutos.




Coccyzus melacoryphus - Foto: Miguel Moreno Palacios

Garrapatero común

Smooth-billed Ani

Crotophaga ani



Autor de la ficha: Patricia Hurtado Vargas.

Foto: Jorge García Melo

Etimología:

El género *Crotophaga* significa que come garrapatas y deriva de las raíces griegas *kroton* (garrapata) y *phagos* (que come). El epíteto *ani* deriva del término Tupí-guaraní *anum*, que es utilizado para referirse a esta especie.

Descripción:

Esta ave presenta color negro lustroso en todo su cuerpo; su pico es curvo y la mandíbula superior tiene una protuberancia que va hasta la frente, también tiene una cola larga que lo caracteriza.

Aspectos ecológicos:

Básicamente se distribuye en todo el territorio colombiano hasta los 2700 m s. n. m. Especie típica de zonas abiertas, como potreros y rastrojos, áreas de cultivos y de crecimiento secundario, pantanos e, incluso, al borde de carreteras. Su dieta se compone principalmente de insectos, especialmente saltamontes que recoge de entre la maleza; ocasionalmente tiene el hábito de desprender garrapatas del ganado, el cual sigue con frecuencia. También se alimenta de pequeñas serpientes,



lagartijas y ranas, y rara vez de frutas y semillas. Es típico verla siguiendo a seres humanos

usando guadañas, aprovechando que estas hacen salir diferentes tipos de animales para así consumirlos sin tanto esfuerzo. Por lo general andan en grupos de más de cinco individuos y anidan comunmente.



Preocupación menor



Insectívoro




Carnívoro



Frugívoro

Alimentación

Cuco ardilla Squirrel Cuckoo *Piaya cayana*



Autor de la ficha: Jorge Arturo Romero Barrera.

Foto: Teresa Castiblanco

Etimología:

La palabra *Piaya* deriva de los criollos de la Guayana Francesa para referirse a esta especie. El epíteto *cayana* se refiere a Cayena, la capital de la Guayana Francesa.

Descripción:

El pico es de color amarillo, ojos de tonalidad anaranjada, piel facial desnuda alrededor del ojo de color amarillo verdoso, la cabeza y garganta de color salmón, más oscuro en la cabeza y más claro en la garganta; las demás partes por encima son de café rufo, incluyendo una cola larga graduada, que por debajo es negra con parches blancos en las puntas. Su pecho y abdomen son de color grisáceo.

Aspectos ecológicos:

Usualmente solitaria, se mueve de forma vertical muy similar a una ardilla, de ahí deriva su nombre común. Típicamente se observa en áreas de bosque, en el dosel; algunas veces se observa atravesar zonas de pastizal arbolado y cafetales. Su dieta es a base de insectos de gran tamaño. Algunas veces puede seguir hormigas legionarias; con numerosas vocalizaciones, por lo general no son recurrentes y pasan más bien desapercibidas.



Preocupación menor



Insectívoro



Carnívoro



Frugívoro

Alimentación



Steatornithidae

Curiosamente esta familia solo cuenta con una especie, el guácharo (*Steatornis caripensis*). Vive en cavernas profundas, son aves nocturnas, es decir, salen de las cavernas a tomar sus alimentos (son las únicas aves nocturnas frugívoras) en horas de la noche. Debido a que habitan en condiciones de baja luz, implementan un sistema de ecolocación (orientación por ecos, similar al sonar); esta ave posee un pico ganchudo y fuerte, a las largas, plumaje marrón con puntos blancos.




Steatornis caripensis - Foto: Jeyson Sanabria Mejía

Guácharo

Oilbird

Steatornis caripensis



Autor de la ficha: Jorge Arturo Romero Barrera.

Foto: Jorge García Melo

Etimología:

La palabra *Steatornis* deriva de las raíces griegas *stéar* y *ornis*, referido a ave de grasa. El epíteto *caripensis* se refiere a las cuevas de Caripé en Venezuela, donde originalmente se describieron los primeros especímenes.

Descripción:

Los ojos son café oscuro, pico largo, ganchudo y estrecho de color café; vibrisas negras y largas. Toda la cabeza y cuerpo es de color castaño marrón con puntos blancos en forma de diamante en las coberturas alares, en las plumas de las primarias externas, en las secundarias y en la cola. Esta última, con matices claros y oscuros en forma de barras.

Aspectos ecológicos:

Especie gregaria, que anida usualmente en cuevas o en áreas escarpadas. De hábitos nocturnos, salen a alimentarse al finalizar la tarde, vuelan en bandadas de tres a cinco individuos, en varias direcciones. Esta especie se ha observado consumiendo semillas de laureles que se encuentran en reservas como el Paraíso del Cocora, uno de los pocos lugares en Ibagué donde se puede avistar esta especie.




Alimentación




Trochilidae

Esta familia está compuesta por todas las especies existentes de colibríes; son consideradas las aves más pequeñas del mundo, de más rápido aleteo, capaces de rotar sus alas hasta 180°. Generalmente tienen plumajes coloridos e iridiscentes, patas cortas, de picos cortos a largos, en algunas especies curvos y muy curvos, adaptados a especies o familias particulares de flores. Se alimentan principalmente del néctar de las flores y de insectos pequeños en temporadas de reproducción.



Chaetocercus heliodor - Foto: Jorge García Melo

Colibrí nuquiblanco White-Necked Jacobin *Florisuga mellivora*



Autor de la ficha: Yair Guillermo Molina Martínez.
Foto: Teresa Castiblanco

Etimología:

El género *Florisuga* se origina de las palabras latinas *floris* y *sugere* para referirse a chupador de flores; el epíteto *mellivora* proviene de las palabras latinas *mel* y *vorus*, aludiendo a que consume o devora miel.

Aspectos ecológicos:

Este colibrí frecuenta principalmente bosques húmedos y sus bordes por debajo de los 2000 m s. n. m.; principalmente en estratos altos, usualmente por encima del dosel. Llega con facilidad a comederos artificiales en donde es bastante territorial y agresivo.



Descripción:

Colibrí de mediano a grande (10 cm). El macho tiene la cabeza completamente azul, dorsalmente verde con una media luna blanca en la espalda, después de la nuca.

Ventralmente es de color blanco desde el pecho, con los flancos, hombros y laterales del pecho de color verde. La cola por debajo es blanca, al igual que las coberturas infracaudales.

Los juveniles macho particularmente presentan una banda canela clara, delgada, que se origina en la base baja del pico y se extiende por debajo del ojo hasta por debajo de los auriculares. La hembra es verde por encima y blanca por debajo, con un escamado verde ampliamente separado, que confluyen en el mentón.

Alimentación




Insectívoro



Preocupación menor

Pico de hoz común Tipped sicklebill *Eutoxeres aquila*



Autor de la ficha: Yolanda Mosos Angarita.

Foto: Miguel Moreno Palacios

Etimología:

Eutoxeres deriva de las raíces griegas *eu* y *toxêrês*, refiriéndose a bien arqueado y *aquila*, derivado del latín águila, referido al pico ganchudo.

Aspectos ecológicos:

Se observa frecuentemente libando en flores de platanillos (*Heliconias*). En época reproductiva se observa cazando pequeños insectos y arañas; habita principalmente hábitats boscosos, en zonas altas húmedas, cerca de arroyos o afluentes de agua con abundancia de heliconias.



Descripción:

Es un colibrí poco común, pero se reconoce fácilmente por su pico en forma de hoz. Su plumaje es verde oscuro bronceado, con la cabeza más oscura; por debajo es blanco con estrías negruzcas que van desde la garganta hasta el abdomen.

Su cabeza y ojos son oscuros. La cola es verde oscuro, con los ápices blancos.



Preocupación menor



Insectívoro




Nectarívoro

Alimentación

Ermitaño canelo

Rufous-breasted hermit

Glaucis hirsutus



Autor de la ficha: Carlos Alfonso Guevara Colmenares.

Foto: Miguel Moreno Palacios

Etimología:

Este nombre está compuesto por griego y latín, *glaucis* deriva de *Glaukos*: verde pálido *glaucos*; *hirsutus* deriva del latín y significa peludo.

Descripción:

Toda su cabeza es de color verde bronceado, posee una raya ocular negra, su pico es largo y de curvado (33 mm aproximadamente), con la parte superior ne-

gra y amarilla por debajo. Todas sus partes inferiores son de color rufo opaco, su cola es redondeada con ápices blancos y por encima de color verde bronceado con rufo canela y con una banda subterminal negra.

Aspectos ecológicos:

Se encuentra principalmente dentro del sotobosque, asociado a heliconias; tiene un rango de distribución altitudinal bien amplio, encontrándolo en bordes de bosque, jardines o plantaciones. Permanece solitario y en épocas de anidación el macho cuida el territorio cerca al nido.



Preocupación menor



Insectívoro




Neclarívoro

Alimentación

Ermitaño verde

Green Hermit

Phaethornis guy



Autor de la ficha: Lucelia Triana Sánchez.

Foto: Miguel Moreno Palacios

Etimología:

La palabra *Phaethornis* proviene del griego *phaethon* y *ornis*, que significa ave resplandeciente. El epíteto *guy* se dio en honor al naturalista francés J. Guy.


Descripción:

Colibrí de mayor tamaño, principalmente verde azulado, contrastante en los machos; las hembras tienden a ser más oscuras con verde en la espalda y gris en el vientre.

Como la mayoría de los ermitaños tienen un pico largo y curvo, por encima negro y por debajo naranja. Presenta las plumas centrales de la cola mucho más largas con ápices blancos.

Aspectos ecológicos:

Especie frecuente en el municipio, sobre todo asociado a áreas húmedas cerca de bosques de galería, muy abundante en áreas rurales con sembradíos de heliconias (e.g. RNSC Paraíso del Cocora). Aunque principalmente asociado a zonas boscosas, se habitúa fácilmente a los bebederos artificiales; por demás, es muy furtivo y rápido, difícil de ver o distinguir en el bosque y, algunas veces, en cultivos con sombra de café y cacao. Se ha observado consumiendo pequeñas arañas e insectos (Obs. S. Vargas).




Alimentación

Ermitaño leonado

Tawny-bellied Hermit

Phaethornis symrathophorus



Autor de la ficha: Patricia Hurtado Vargas.

Foto: Miguel Moreno Palacios

Etimología:

El género *Phaethornis* deriva de las palabras griegas *phaethon* que significa sol y *ornis* que significa ave. El epíteto *symrathophorus* viene del griego *syрма* (túnica con cola larga) y *phóros* (que porta), que hace referencia a la pluma central larga de la cola.

Aspectos ecológicos:

Es el colibrí ermitaño de zonas media a altas; habita el sotobosque de selvas húmedas y muy húmedas, cerca de afluentes de agua y rara vez fuera del bosque. Como muchos colibrís en época reproductiva emite la misma vocalización por largos periodos de tiempo; particularmente los machos pueden conformar *leks* congregándose en áreas de exhibición.

Descripción:

Este colibrí tiene un pico largo y curvo, el cual es negro en la mandíbula superior y anaranjado en la inferior; su cabeza, nuca y dorso son de color café con tonos amarillo oscuro. Presenta una lista ocular y malar café oscuro y una pequeña lista superciliar de color blanco; su mentón es blanco y la zona ventral que incluye la garganta, pecho y abdomen es amarillo oscuro rufecente; las alas son café oscuro. Tiene una cola que termina en punta y en cuanto a la coloración presenta amarillo oscuro rufecente en las coberteras supracaudales, las rectrices son verdes con un borde color crema y la región que sobresale de las rectrices centrales es de color blanca.



Preocupación menor



Insectívoro




Nectarívoro

Alimentación

Mango pechinegro

Black-throated Mango

Anthracothorax nigricollis



Autor de la ficha: Teresa Castiblanco Leal.

Foto: Jorge García Melo

Etimología:

Anthracorax del latín *anthrax*, negro o carbón; *thorax*, pecho; *nigricollis* de *niger*, negro y *collis*, cuello.

Descripción:


Colibrí de aproximadamente 11 cm. Con diferencia de colores entre macho y hembra. El macho es de color verde esmeralda reluciente en la

cabeza y espalda, ojos y pico negro, garganta y pecho azul con lista negra horizontal; alas negras y cola rufa (purpúreo) con banda terminal negra. La

hembra se caracteriza por tener garganta, pecho y abdomen blanco con una lista central negra, con cola rufa con banda terminal blanca.

Aspectos ecológicos:

Este colibrí frecuenta bosques secundarios, bordes de selva, zonas de cultivos, jardines y zonas cercanas a fuentes hídricas. Su principal alimento es el néctar de flores de árboles altos y se observa muy poco en plantas ornamentales. De igual manera, se ha observado capturando al vuelo insectos.



Preocupación menor



Insectívoro




Nectarívoro

Alimentación

Colibrí cabecicastaño del Tolima

Tolima Blossomcrown

Anthocephala berlepschi



Autor de la ficha: Yair Guillermo Molina Martínez.


Foto: Luis Eduardo Urueña

Etimología:

El género *Anthocephala* se origina del griego *anthos* y *kephale* para referirse a cabeza florecida; el epíteto *berlepschi* se da en honor al ornitólogo alemán Hans Hermann Carl Ludwig Graf von Berlepsch (1850-1915), especialista en aves neotropicales.

Aspectos ecológicos:

Este colibrí frecuente bordes de bosque, matorrales o cerca de ellos en zonas de cultivos, jardines y áreas cercanas a fuentes hídricas. Se observa muy poco en libaderos artificiales, probablemente porque es agredido por otras especies; no obstante, se ha observado libando en diferentes plantas ornamentales y en particular de manera silvestre en *Fuchsia sp.* Aunque se distribuye en numerosos municipios del Departamento en realidad es muy escaso y difícil de ver.



Descripción:

Colibrí relativamente mediano (7.5 cm). En general de color verde a verde cobrizo por encima, y con garganta y partes centrales ventralmente teñidas de blanco grisáceo, que se degrada a verde en los flancos formando un chaleco. La cola es verde a verde broncea, particularmente con ápices blancos, al igual que cobertores infracaudales de la cola. El macho particularmente presenta la coronilla rufo oscuro, con una mancha blanca contrastante en la frente. El pico esico negro, recto, corto y pequeño punto postocular blanco.



Vulnerable



Endémico




Insectívoro



Nectarívoro

Alimentación

Inca bronceado Broncy Inca *Coeligena coeligena*



Autor de la ficha: Rossmayra Marulanda Bejarano.

Foto: Miguel Moreno Palacios

Etimología:

Coeligena proviene del latín *coeligenus*, que significa nacido del cielo, algo celestial.

Aspectos ecológicos:

Se encuentra principalmente en flores de estrato medio, en bordes de bosque o en el interior de la selva; común en selvas húmedas y muy húmedas de montaña, se distribuye de los 1500 hasta los 2600 m s. n. m., prefiriendo alimentarse de flores largas y tubulares.

En raras ocasiones puede incursionar en cultivos de café o en áreas abiertas con abundantes árboles dispersos, incluso se cree que es migratorio altitudinal estacional.



Descripción:

Uno de los colibrís más grandes del área. Pico largo, casi equivalente a la mitad del cuerpo, tubular y de color negro; ojos café oscuro con una mancha post ocular blanca. Su plumaje principal va de café bronceado a púrpura iridiscente, marrón oliva en la espalda baja, garganta y pecho grisáceo con estrías marrón, partes inferiores café rufo.

Alas negruzcas y cola ancha, bifurcada, de color bronce oscuro con infracaudales con borde canela. Las hembras son similares a los machos, pero aparentemente presentan picos más largos y colas más cortas.




Alimentación

Inca collarejo

Collared inca

Coeligena torquata



Autor de la ficha: Juan Felipe del Castillo Téllez.

Foto: Miguel Moreno Palacios

Etimología:

Coeligena significa que nació en cielo y su epíteto *torquata* significa adornado con un collar.

Descripción:

Es un colibrí de gran tamaño, presenta un pico negro, recto, delgado y largo, con casi todas sus partes inferiores y superiores de color verde negruzco, excepto un punto azul en la coronilla y la garganta, la cual muestra una banda triangular de color blanco. La cola es blanca con ápice negro.

Aspectos ecológicos:

Son colibríes de zonas altas, de bosques húmedos y muy húmedos de los Andes, en rutas al interior del bosque y en sus bordes principalmente en arbustos y flores bajas.



Preocupación menor



Insectívoro




Nectarívoro

Alimentación



Colibrí pico de sable Sword-billed hummingbird *Ensifera ensifera*



Autor de la ficha: Juan Felipe del Castillo Téllez.

Foto: Jorge García Melo

Etimología:

La palabra *Ensifera* se deriva del latín *ensiferus*, referido a que carga una espada.

Descripción:

Su cabeza es de color bronce cobrizo, con un pico extremadamente largo (12 cm aproximadamente), de color negro con una leve curvatura hacia arriba; siendo el colibrí con el pico más

largo, fácilmente es recono-

cido. Todas sus partes

superiores son ver-

de bronceo, la

garganta

negruzca y los

lados de la gar-

ganta junto con

el pecho presentan

una coloración ver-

de iridiscente; el resto

de las partes inferiores es

verde brillante. Presenta dimorfismo

sexual, en donde la hembra es idéntica

por encima al macho, pero la garganta

es blancuzca, punteada de color oliva,

con el resto de sus partes inferiores es

punteada de verde; con la cola negruz-

ca por encima y blanca marginada de

grisáceo, por debajo.

Aspectos ecológicos:

Habita las selvas húmedas andinas, las transiciones del bosque alto andino al páramo, bordes de bosque, jardines y cultivos, distribuyéndose entre los 2400 a 3100 m s. n. m.

Se observa con facilidad en el cañón del Combeima, asociado a flores de la familia Passifloraceae (curuba, maracuyá, granadilla etc), especies del género Fuchsia, algunas epifitas y algunos insectos en temporada reproductiva. Usualmente solitario y territorial.




Alimentación

Esmeralda pico rojo

Red-billed emerald

Chlorostilbon gibsoni



Autor de la ficha: Beatriz Méndez Cubillos.

Foto: Jorge García Melo

Etimología:

El género *Chlorostilbon* proviene de las raíces griegas *khōlros* y *stilbón*, referido a color verde reluciente, respectivamente. El epíteto *gibsoni* fue dado en honor al colector Sr. Gibson.

Descripción:

Es uno de los colibrís más pequeño en el área, de color verde iridiscente, con el pecho contrastantemente más brillante; el pico es recto, la mandíbula superior es negra e la inferior es roja; la cola es bifurcada de color negro azulado. La hembra difiere del macho por una ceja superciliar blanca seguida de una pequeña máscara negra. Todas las partes por debajo son blancas, exceptuando los flancos que están teñidos de verde.

Aspectos ecológicos:

Se distribuye principalmente por debajo de los 1600 m s. n. m., en bosques húmedos en áreas abiertas, en matorrales y en bordes de bosque; también se ha encontrado en zonas urbanas arboladas, incluso llamando insistentemente durante todo el día libando en el casco de vaca (*Bauhinia* sp.), presumiblemente en periodo reproductivo, perchedo en ramas o en cuerdas de la luz. Comúnmente solitario, liba flores con corolas pequeñas y aparentemente en rutas.



CE
Endémico

LC
Preocupación menor



Insectívoro




Nectarívoro

Alimentación

Colibrí culiblanco

White-vented Plumeleteer

Chalybura buffonii



Autor de la ficha: Yair Guillermo Molina Martínez.

Foto: Rossmayra Marulanda

Etimología:

El género *Chalybura* proviene de las raíces griegas, *khalups* y *oura*, referido a cola de acero. El epíteto *buffonii* fue dado en honor al naturalista francés George-Louis Leclerc Comte de Buffon (1707–1788).

Descripción:

Es uno de los colibrís relativamente más grande en el área, de color verde iridiscente, con coberteras infracaudales blancas. La hembra, a diferencia del macho, es ventralmente blanca con los flancos verdes que simulan un chaleco.

En general el pico es relativamente largo (2.5 cm), completamente largo y ligeramente curvado; pequeña mancha postocular blanca, cola negruzca con ápices blancos en la hembra.

Aspectos ecológicos:

Se distribuye principalmente por debajo de los 1800 m s. n. m., en bosques húmedos principalmente en áreas raparías, interiores de bosque y bordes. Se congrega usualmente con otros colibrís en árboles florecidos, donde usualmente es agresivo; puede llegar a comederos artificiales, aunque no es muy abundante en el tiempo.



Preocupación menor



Insectívoro




Nectarívoro

Alimentación

Ninfa coronada

Purple-crowned Woodnymph

Thalurania colombica



Autor de la ficha: Diba Andrade.

Foto: Rossmayra Marulanda

Etimología:


El género *Thalurania* deriva de las raíces griegas *thalos* y *ouranos* que hacen referencia consecutivamente a niño del cielo; el epíteto *colombica* hace referencia a Colombia, donde fue descrita.

Descripción:

El macho adulto exhibe una coloración púrpura en todas las partes, por debajo desde el pecho medio; el tono púrpura iridiscente es muy llamativo en la frente y abdomen, lo cual contrasta con el verde brillante en la garganta. Por encima es verde oscuro, con alas negras y cola fina ahorquillada azul oscuro. La hembra es similar pero la coloración púrpura es cambiada por verde, desde la garganta hasta el pecho bajo es blanco; particularmente el ápice de la cola es blanco.

Aspectos ecológicos:

Se distribuye principalmente por debajo de los 1900 m s. n. m. Esta especie puede llegar a ser rara o difícil de ver, pero en los últimos años ha comenzado a visitar libaderos; habita principalmente bosques húmedos y sus bordes; algunas veces incursiona a zonas más abiertas, visitando flores de una amplia variedad de plantas en particular epifitas. Se ha reportado libando heliconias y manteniendo territorios de forrajeo (Ob. A. Buitrago y H. Contreras).



Preocupación menor



Insectívoro




Nectarívoro

Alimentación



Amazilia frentiazul Indigo-capped Hummingbird *Saucerottia cyanifrons*



Autor de la ficha: Yair Guillermo Molina Martínez.

Foto: Gissela Sánchez

Etimología:

El género *Saucerottia* se dio en honor al ornitólogo francés Antoine Constant Saucerotte (1805-1884). Proviene de las raíces griegas *khalups* y *oura*, referido a cola de acero. El epíteto *cyanifrons* proviene de las raíces latinas *cyaneus* y *frons* para referirse a que la frente que es de color azul oscuro.

Descripción:

Es un colibrí de tamaño mediano, de pico negro, con la mandíbula inferior anaranjada desde la porción media; en general es de color verde iridiscente con rabadilla y supracaudales verde cobrizo. Son determinantes la frente y coronilla azul oscuro y plumas coberteras infracaudales en forma de escamas azul oscuro violáceo, bordeadas de blanco.

Aspectos ecológicos:

Se distribuye principalmente por debajo de los 2100 m s. n. m., en bosques húmedos y bordes de bosque, y cerca a ellos, en matorrales y áreas de cultivo. Por lo general, llega a comederos artificiales, aunque no es muy abundante en el tiempo. Aunque se mueve rápido y difícil de ver, suele presentarse rodeando árboles florecidos, interactuando agonísticamente con otros colibrís.



Preocupación menor



Endémico




Alimentación

Amazilia colirufa

Rufous - tailed hummingbird

Amazilia tzacatl



Autor de la ficha: José Sosa Salgado.

Foto: Jorge García Melo

Etimología:

Amazilia, voz quechua, nombre de una princesa Inca. El término *tzacatl* es el nombre de un jefe guerrero mitológico Azteca.

Aspectos ecológicos:

Es uno de los colibrís más comunes en Colombia, tanto en el área urbana como rural del municipio de Ibagué. En la zona cafetera es frecuente en áreas abiertas de cultivos de café con sombrío. Particularmente se observa con mayor frecuencia en la temporada de floración de guamos (*Inga sp.*) y nacederos (*Trichanthera gigantea*, enero-mayo); habitualmente se observa libando heliconias, caña agria y bebederos artificiales. Es un colibrí supremamente territorial y solitario. Construye su nido a baja altura en áreas no intervenidas, con materiales naturales del hábitat donde permanece.



Descripción:

El pico es recto de color rojo con la punta negra; la cabeza, el cuello, la garganta y espalda son verdes entremezclado con tintes amarillentos, predominando el verde. El abdomen presenta un color gris opaco, el pecho al sol presenta una tenue iridiscencia dorada. Los ojos son café oscuro. La cola rufa y las alas descolgadas de color negro brillante.



Preocupación menor




Insectívoro



Neclarívoro

Alimentación

Esmeralda andina Andean Emerald *Uranomitra franciae*



Autor de la ficha: Patricia Hurtado Vargas.

Foto: Miguel Moreno Palacios

Etimología:

El nombre del género *Uranomitra* se deriva de las palabras griegas *ouranos* y *mitra* para referirse respectivamente a cielo y diadema, es decir, diadema del cielo; el epíteto *francae* fue dado en honor a Francia Bourcier, la hija del naturalista Jules Bourcier, experto en colibríes.

Aspectos ecológicos:

La especie se distribuye en la región andina desde los 600 hasta los 2100 m s. n. m.; habita bosques secundarios, bordes y claros de bosque. Al igual que los demás miembros de la familia Trochilidae construye nidos en cesto similares a una copa y utiliza líquenes en la superficie externa de los nidos como estrategia de camuflaje. Usualmente solitarios, hembra y macho se encuentran exclusivamente en la cópula, pues la hembra se encarga sola del cuidado parental de las crías.



Descripción:

El macho tiene un pico recto, mediano de color negro; la frente y corona son de color azul-violáceo iridiscente; la parte dorsal del ave (cabeza, nuca, espalda y rabadilla) es de color verde esmeralda iridiscente; la región ventral es de color blanco (garganta, pecho y abdomen); las escapulares son también de color verde esmeralda y el resto del ala presenta color verde oscuro; las coberteras supracaudales son de color ocre y las rectrices en general son de color verde con matices ocre. La hembra presenta características muy similares, pero su frente y corona no tienen color azul-violáceo, sino que es de color verde esmeralda iridiscente.



Insectívoro



Nectarívoro

Alimentación

Rallidae

Los miembros de esta familia son conocidos como pollas de agua, gallinetas y calamones, se distribuyen por todo el mundo, a excepción de zonas polares y desérticas, son de hábitos acuáticos y terrestres, habitan en ambientes húmedos cerca de lagos y ríos. Poseen un tamaño de pequeño a mediano, pico comprimido, alas cortas y redondeadas, cuello usualmente largo, al igual que sus dedos; se alimentan de insectos, larvas, hojas y granos.




Pardirallus maculatus - Foto: Jeyson Sanabria Mejía

Chilacoa colinegra

Gray-necked Wood-Rail

Aramides cajaneus



Autor de la ficha: Rossmayra Marulanda Bejarano.

Foto: Jorge García Melo

Etimología:

El género *Aramides* se deriva de las raíces griegas *eidês* y *aramos*, para referirse a parecido a garza, respectivamente; el epíteto *cajaneus* hace referencia a Cayena, capital de la Guayana Francesa.

Aspectos ecológicos:

Comúnmente encontrada próxima a orillas de lagunas, quebradas, manglares y ríos. Habita cerca de bosques de galería hasta los 2000 m s. n. m., en su mayoría de veces difícil de ver, no obstante, puede ser encontrada por su fuerte vocalización; anda en parejas o grupos pequeños.

Dependiendo de que tanto es molestada cuando se encuentra con el hombre, puede dejarse ver cerca a humedales y jardines, incluso cerca a vivienda humanas.

Descripción:

Es un ave grande, el pico parcialmente largo, amarillo en su base y verdoso en la punta; los ojos rojos, corona castaña, patas rojas coral, cabeza y cuello grisáceo, pecho y laterales castaños. Las partes superiores verde oliva; la rabadilla y abdomen negro.



LC

Preocupación menor



Insectívoro



Carnívoro

Alimentación

Charadriidae

Esta familia incluye a los chorlitos y avefrías, se distribuyen alrededor del mundo en hábitats acuáticos. Aves de tamaño pequeño a medio, pico recto y corto, cabeza redonda, cuello corto, alas largas y puntiagudas, se alimentan de larvas, lombrices de tierra y pequeños peces.




Vanellus cayanus - Foto: Jeyson Sanabria Mejía

Alcaraván

Southern Lapwing

Vanellus chilensis



Autor de la ficha: Yair Guillermo Molina Martínez.

Foto: Jorge García Melo

Etimología:

El género *Vanellus* es una palabra latina usada para llamar a las avesfrías; el epíteto *chilensis* hace referencia a Chile.

Aspectos ecológicos:

La especie se distribuye en toda Colombia, desde zonas bajas a altas (3300 m s. n. m.). Principalmente asociada a áreas abiertas anegadas, humedales y demás hábitats acuáticos abiertos en playas y bordes. También se puede encontrar asociada a áreas de pastizal natural y de mantenimiento de ganado, incluso en lotes baldíos enmontados en zonas urbanas. Se alimenta principalmente de macroinvertebrados y pequeños vertebrados; anida en áreas abiertas, donde protegen fuertemente sus crías, a tal punto que ante la presencia del hombre o un posible predador arremeten en vuelo a manera de intimidación. Por lo general son ruidosos, incluso se escuchan a altas horas de la noche en las ciudades.



Descripción:

En general presenta una coloración gris oliva por encima, con plumas en penacho corto y negro que caen hacia atrás; ojos rojos, pico rosado con la punta negra; la frente, alrededor del pico y parte de la garganta también son de color negro. Las partes en el pecho alto son de color gris oliva y con una banda negra ancha en el pecho medio y bajo; las demás partes por debajo son blanco inmaculado. Patas largas, fuertes y rosadas oscuro; particularmente presentan dos espolones no tan conspicuos en las escápulas.

LC

Preocupación menor



Insectívoro



Carnívoro

Alimentación

Ardeidae

Esta familia incluye a las aves conocidas como garzas, tienen una distribución prácticamente global, a excepción de la Antártida; escasas en zonas altas, más frecuentes y diversas en regiones tropicales y zonas bajas, habitan en ambientes acuáticos como lagos y lagunas, anidando en arboles altos próximos a estos cuerpos de agua. Poseen picos, cuellos y patas largas, usualmente de tamaño medio a grande, diseñados para alimentarse de peces e insectos.




Egretta thula - Foto: Jorge García Melo



Garcita del ganado

Cattle Egret

Bubulcus ibis



Autor de la ficha: Yair Guillermo Molina Martínez.

Foto: Jeyson Sanabria Mejía / Jorge García Melo

Etimología:

El género *Bubulcus* es una palabra latina que hace referencia a pastor de vacas, ya que esta especie es común verla asociada al ganado; el epíteto *ibis* es una palabra de origen latino, griego y, al parecer, egipcia para denominar a diferentes tipos de aves acuáticas, en la que se puede relacionar a las garzas.



Aspectos ecológicos:


Especie común en toda Colombia hasta los 3500 m s. n. m.; se distribuye principalmente en áreas abiertas, en pastizales usualmente con presencia de ganado vacuno, el cual en su marcha espanta numerosos animales, desde insectos hasta pequeños vertebrados (ranas, lagartijas y serpientes), los cuales se hacen visibles y son capturados por la garza. También se asocia a zonas húmedas y sus orillas; por en los atardeceres se ven volando en bandadas en forma de V, a dormideros o nidos gregarios, en árboles.

Descripción:

Garza completamente blanca, en general de pico y patas amarillas, medianamente largas. En época reproductiva puede exhibir una coloración amarillo quemado en la corona, espalda y centro del vientre, algunas veces se adorna de plumas en forma de penachos que salen de la corona; también en esta época el pico y las patas se pueden tornar amarillo anaranjado. En plumaje no reproductivo puede presentar las patas negras. De las garzas colombianas de color blanco generalizado es la de menor tamaño.



Preocupación menor




Alimentación

Garza blanca

Great White Egret

Ardea alba



Autor de la ficha: Rossmayra Marulanda Bejarano.

Foto: Luis Eduardo Urueña

Etimología:

Ardea es una palabra latina que significa garza; el epíteto es derivado del latín *albus*, haciendo referencia a que es de color blanco.

Descripción:

Ave grande, de plumaje blanco, ojos y pico amarillo en forma de cincel, patas largas y delgadas de color negro.

De las garzas colombianas de color blanco generalizado es la de mayor tamaño, diferenciándose de *Bubulcus ibis*, que es casi dos veces más pequeña en altura y corpulencia; por otra parte, *Egretta thula* es un poco más grande que *B. ibis*, pero su pico es negro al igual que sus patas, exceptuando los dedos que son amarillos.

Aspectos ecológicos:

Se alimenta en aguas poco profundas, principalmente de lombrices, insectos, peces, ranas y pequeños mamíferos. Comúnmente encontrada en manglares, ríos, lagos, lagunas de tierras bajas; posee una amplia distribución en zonas bajas en todo el país. Puede verse con frecuencia en áreas de cultivo de arroz; en general, siempre se en menores números que otras garzas blancas. De cantos ronc y guturales.



Insectívoro



Carnívoro




Piscívoro

Alimentación



Threskiornithidae

Familia compuesta por los ibis y espátulas, aves de cuello y patas alargadas, tamaño de medio a grande, pico recto y largo, presentando diversas coloraciones de plumaje. Distribuido a nivel global, se asocian a cuerpos de agua dulce; se alimentan de gran variedad de invertebrados y algunos pequeños vertebrados.




Theristicus caudatus - Foto: Jorge García Melo

Coquito

Bare-faced Ibis

Phimosus infuscatus



Autor de la ficha: Patricia Hurtado Vargas.

Foto: Jorge García Melo

Etimología:

Su nombre significa ibis de careta oscura; deriva de la raíz griega *phi-mós* que significa careta y del latín *infuscus* que significa oscuro.

Aspectos ecológicos:

En general la especie se distribuye por todo el territorio colombiano por debajo de 1000 m s. n. m., aunque en los últimos años se han encontrado en zonas altas. Habita zonas húmedas y pantanosas, cerca de depósitos de agua dulce, como potreros anegados, humedales, bordes pantanosos de lagunas, canales de drenaje, ríos en zonas rurales como urbanas. Con nidos en forma de plataforma, en los últimos años se ha observado que anida en diferentes barrios de la ciudad de Ibagué, en árboles frondosos, incluso, en separadores de carretera. Se alimenta de gran variedad de granos, insectos, larvas, crustáceos, anfibios, moluscos y peces.

Descripción:

Los individuos de esta especie tienen un pico largo y ligeramente curvo. La cara se encuentra sin plumaje y se observa su piel, la cual es de color rosa a rojo. El resto de su cuerpo es de color negro y es posible ver algunos destellos de verde oscuro lustroso.



Preocupación menor



Insectívoro




Carnívoro

Alimentación




Cathartidae

Dentro de esta familia están inmersos los gallinazos, chulos, cóndores, zopilotes y buitres, se alimentan principalmente de carroña (animales muertos) que localizan a gran altura, gracias a su excelente sentido de la vista y del olfato; son diurnos y su distribución se limita al continente americano. Usualmente poseen plumajes de colores oscuros a excepción del rey de los gallinazos (*Sarcorampus papa*), el cual tiene una coloración, en su mayoría, blanca y colores castaños y amarillos en su cabeza. Las especies de esta familia generalmente cuentan con un pico ganchudo y fuerte para despedazar sus presas.



Cathartes burrovianus - Foto: Jorge García Melo

Chulo Black Vulture *Coragyps atratus*



Autor de la ficha: Diba Andrade.

Foto: Santiago Vargas Sánchez

Etimología:

El nombre del género deriva de las palabras en griego *korax* (cuervo: negro) y *gyps* (buitre) refiriéndose a buitre negro; el epíteto *atratus*, es una palabra en latín que significa vestido de luto.

Aspectos ecológicos:

Es la especie de buitre más común y abundante en toda Colombia, tanto en áreas urbanas como rurales, asociada a áreas abiertas y semiabiertas, como lotes baldíos, áreas de depósito de basuras y sitios en donde se desechen animales o restos de ellos. El chulo no construye nidos, es más bien oportunista haciendo sus posturas en el suelo, de matorrales o pastizales, en peñascos con cavidades, cuevas, incluso, en construcciones humanas abandonadas. Al igual que otros carroñeros son susceptibles de atropellamiento en las carreteras al forrajear animales muertos en la vía.



Descripción:

Ave con un plumaje negro, a excepción de seis plumas primarias de las alas, que en la cara interna se ven blancas o gris pálido; se caracteriza por la ausencia de plumas en su cabeza y cuello, en esta área su piel es corrugada y de color negro grisáceo.




Preocupación menor



Carroñero

Alimentación

Guala común Turkey vulture *Cathartes aura*



Autor de la ficha: Juan Felipe del Castillo Téllez.

Foto: Carlos A. Guevara

Etimología:

La palabra *Cathartes* es proveniente del griego *kathartês*, que significa purificador o que limpia, y *aura* deriva de la palabra *aurouá*, originaria de comunidades indígenas mexicanas, utilizada para referirse a esta especie.

Descripción:

Su cabeza es desnuda, de color rojo con cera amplia, observándose claramente las narinas; la punta del pico es amarillenta y el iris es marrón oscuro. El resto de su cuerpo es negro parduzco, con excepción de las coberturas del ala que tienen marcas submarginales grises claro, vista por debajo en vuelo; presenta la cola cuadrada y de patas rosadas claras.

Aspectos ecológicos:

Es común en zonas secas, principalmente en áreas abiertas, aunque en ocasiones sobrevolando bosques o muy alto dando círculos en zonas de viento termal. En general se observa en sobrevuelo, guiándose por su olfato para encontrar animales en descomposición, frecuenta grupos de chulos o solitaria. Se puede observar hasta los 3000 m s. n. m., distribuyéndose por gran parte del territorio nacional.



Preocupación menor




Carroñero

Alimentación

Accipitridae

Aves rapaces diurnas dentro de las que se encuentran águilas y gavilanes, son carnívoras y se caracterizan por tener un gran pico fuerte y ganchudo, usado para desgarrar la carne de sus presas, ojos situados lateralmente y una aguda visión que le permite localizar sus presas a gran distancia. Poseen tamaños variados de medianos a grandes, sin dimorfismo sexual, aunque por lo general las hembras son más grandes que los machos.




Buteogallus meridionalis - Foto: Jorge García Melo

Gavilán caminero

Road-side Hawk

Rupornis magnirostris



Autor de la ficha: Miguel Moreno Palacios.

Foto: Gissela Sánchez

Etimología:

Rupornis, ave manchada. Hace referencia a las barras café en el cuerpo del ave. Proviene del griego *rhýpos*, que significa suciedad, inmundicia, porquería, y *órnis*, ave. El epíteto *magnirostris*, con pico grande, del latín *magnus*, grande, y *ros-tris*, pico.

Aspectos ecológicos:

Gavilán de amplia distribución en el Neotrópico. Común en Colombia desde 0 m a 2500 m s. n. m. Muy vocal desde percha y volando. Prefiere bordes de bosque (seco o húmedo), bosques de galería, crecimientos secundarios, mosaicos de paisaje con parches de bosque. Generalmente ausente en bosques primarios densos y en zonas desérticas. De dieta oportunista, principalmente insectos y aves, pero también anfibios, roedores, murciélagos y otros vertebrados pequeños.

Descripción:

Iris amarillo, pico amarillo con extremo negro y ganchudo. Cabeza, pecho y espalda de color gris parduzco. Partes inferiores barradas de color café rojizo alternado con blanco. En vuelo se puede observar un parche rufo característico en la base de las plumas primarias. Cola rufa con cuatro a cinco bandas gruesas, negras o grises. Las hembras son similares a los machos, pero más grandes, como pasa en muchas águilas y gavilanes. Los individuos inmaduros tienen el iris café, la cabeza y espalda estriada color ante, pecho estriado café; partes bajas barradas como en adulto, pero más clara.



Preocupación menor



Carnívoro

Alimentación


Momotidae

Aves tropicales conocidas como momotos y barranqueros, son de tamaño mediano, poseen una cola larga que, en la mayoría de las especies, está desplumada en la mitad, mostrando la apariencia de una raqueta, la cual mueven de lado a lado en presencia de depredadores. Todas las especies tienen un plumaje con colores vistosos, dentro de los que se destacan los verdes, azules y castaños. Cuentan con un fuerte pico, ganchudo en su punta y dentado en los bordes, que les permite sujetar a sus presas (insectos, lagartijas, gusanos, pequeñas serpientes y algunas frutas).



Momotus subrufescens - Foto: Jorge García Melo

Barranquero andino Andean Motmot *Momotus aequatorialis*



Autor de la ficha: Patricia Hurtado Vargas.

Foto: Rossmayra Marulanda

Etimología:

El género *Momotus* proviene del nombre específico *Ramphastos momota*, el epíteto *aequatorialis* es una palabra en latín antiguo que significa ecuatorial.

Descripción:

Tiene una coronilla y antifaz negro; rodeando la coronilla, a manera de anillo, se presenta una coloración azul celeste. Los ojos son rojos, la nuca, garganta, pecho y abdomen son de color verde oliva; en el pecho tiene una mancha negra contrastante. El dorso y escapulares son de color verde lima y la región inferior de las alas y el cuerpo (dorsalmente) es azul celeste, al igual que su larga cola en forma de raqueta.

Aspectos ecológicos:

Se distribuye entre los 1000 y 3100 m s. n. m.; habita bosques húmedos de montaña y una gran variedad de hábitats cerca de bosques, desde cultivos, áreas abiertas con árboles dispersos, hasta claros de bosque. Aunque fácil de ver, se reconoce por su canto característico de dos notas que parecieran decir *gurup - gurup*, diferente de *guup* de una nota del *M. subrufescens*.

Omnívoro, puede llegar a alimentarse de lombrices, ranas, lagartijas, serpientes, colibrís e, incluso, ratones y murciélagos. Construye sus nidos en madrigueras.



Preocupación menor



Insectívoro



Frugívoro




Carnívoro

Alimentación

Alcedinidae

Sus miembros suelen denominarse martines pescadores, poseen una cabeza de gran tamaño en relación con su cuerpo, cola corta, pico largo y puntiagudo, el color del pico está relacionado con su dieta. Los martines de pico amarillo suelen alimentarse de insectos y arañas, en algunas ocasiones atrapan pequeños renacuajos; por otro lado, los de pico negro son piscívoros. En general, cuentan con diversas coloraciones en su plumaje y la mayoría de las especies presentan dimorfismo sexual.




Megaceryle torquata - Foto: Gissela Sánchez

Martín pescador amazónico

Amazon Kingfisher

Chloroceryle amazona



Autor de la ficha: Diba Andrade.

Foto: Jorge García Melo

Etimología:

El género *Chloroceryle* proviene de las raíces griega y latina respectivamente *khōlros* y *ceryle* para referirse a verde y martín pescador (género *Ceryla*); el epíteto es referido a proveniente de la Amazonía.

Descripción:

El macho tiene la cabeza (a excepción del mentón), dorso, alas y rectrices de color verde oscuro metalizado con un collar blanco, al igual que el abdomen. El pecho tiene una coloración ocre, además, se caracteriza por su pronunciada

cresta hacia atrás, pico negro robusto y largo. La hembra presenta características muy similares, pero a diferencia de este no posee la coloración ocre en el pecho, en lugar de esta, tiene una mancha pectoral en verde oscuro metalizado a manera de V, que no se cierra al final.

Aspectos ecológicos:

El martín pescador amazónico se distribuye en bosques secos a húmedos, en arroyos, ríos y lagos hasta los 1200 m s. n. m.; su dieta se compone principalmente de peces, que captura sumergiéndose en picada y capturándolo con el pico. Anidan comúnmente en barrancos o bancos de arena cerca, de afluentes de agua principalmente en verano.




Alimentación

Martín pescador verde

Green Kingfisher

Chloroceryle americana



Autor de la ficha: Diba Andrade.

Foto: Carlos A. Guevara

Etimología:

El género se refiere a martín pescador verde; el epíteto relaciona a América.

Aspectos ecológicos:

Es uno de los martín pescador más comunes en Colombia, visto hasta los 1500 m s. n. m. Al igual que otros martines habita en zonas con cuerpos de agua de varios tipos, como ríos, arroyos, manglares y humedales en general. En particular, es una especie piscívora, pero ocasionalmente consume crustáceos e insectos e, incluso, pequeños vertebrados. Anida de forma similar que el *C. amazona* en barrancos y bancos de arena.



Preocupación menor

Descripción:

Martín pescador pequeño; el macho presenta en la cabeza, dorso, alas y rectrices color verde oscuro metalizado, en estas dos últimas regiones corporales presenta pequeñas manchas blancas; tiene un collar blanco, al igual que el vientre.

Tiene una banda pectoral gruesa de color ocre y bajo esta, hacia los flancos, posee manchas de color verde oscuro metalizado. De forma similar que el *C. amazona* presenta un característico penacho y

pico grueso y largo. La hembra es similar al macho, pero no posee la banda ocre del pecho, en su lugar, presenta una doble banda difusa de color verde oscuro metalizado, que contrasta con una coloración beige en la garganta.



Piscívoro

Alimentación



Galbulidae

Aves tropicales de América que incluyen a los jacamares y yacamará, suelen parcharse en las ramas de los árboles para atrapar insectos voladores, los cuales son la base de su alimentación. Poseen picos largos y delgados, colas largas y cabeza redondeada con cuello corto. Los plumajes son usualmente en coloraciones verdes azuladas, marrones y castañas, con una apariencia similar a un colibrí de gran tamaño. Habitan usualmente en bordes de bosques.




Galbula ruficauda - hembra - Foto: Luis Eduardo Urueña

Jacamar colirrufo

Rufous-tailed Jacamar

Galbula ruficauda



Autor de la ficha: Juan Felipe del Castillo Téllez.

Foto: Luis Eduardo Urueña

Etimología:

Galbula significa pequeña ave amarilla y *ruficauda* proveniente del latín *rufous*, y *cauda* se refiere a cola rufa.

Aspectos ecológicos:

Habita en las tierras bajas, observándose hasta los 1300 m s. n. m. En el valle del Magdalena prefiere los bosques principalmente secos y semiáridos, alimentándose de un gran número de órdenes de insectos como lepidópteros, odonatos e himenópteros, especializados en presas de vuelo rápido.

Se observa por lo general a baja y mediana altura, silencioso o a veces cantando un trino no muy llamativo; puede volar y regresar a la misma percha o otra cercana.

Descripción:

Su cabeza y demás partes superiores son de color verde metálico cobrizo, igual que su cola larga y graduada. Presenta un pico largo y negro, de aproximadamente siete cm.

Tiene una barra pectoral verde metálico cobrizo. Las plumas primarias son negras y el resto de las plumas son verdes. De garganta blanca, el vientre es color castaño,

igual que las plumas infra caudales. Presenta dimorfismo sexual, en donde la hembra es más opaca que el macho y su garganta es de color ante.



Alimentación



Bucconidae

Aves tropicales conocidas como bucos, bobos, monjitas y bigotudos, de plumaje usualmente opaco, principalmente castaños, grisáceos y rojizos, poseen una gran cabeza y un pico aplanado y cola corta. Se alimentan de insectos, pequeños vertebrados y ocasionalmente de frutos; anidan en el suelo en túneles que excavan profundamente (hasta de un metro).




Hypnelus ruficollis - Foto: Jeyson Sanabria Mejía

Bigotudo canoso

Moustached Puffbird

Malacoptila mystacalis



Autor de la ficha: Patricia Hurtado Vargas.

Foto: Teresa Castiblanco

Etimología:

Su nombre *Malacoptila* significa de plumaje suave y deriva de las raíces griegas *malakos* (suave) y *ptilon* (plumaje). Su epíteto *mystacalis* significa bigote y proviene del griego *mustax*.

Aspectos ecológicos:

La especie se distribuye desde los 800 hasta los 2100 m s. n. m.; habita principalmente bosques húmedos, vegetación secundaria y bordes de bosque; emplea el estrato bajo y los márgenes de la vegetación. Se alimenta principalmente de insectos que captura en vuelo. Particularmente, anida en agujeros en barrancos de tierra, cerca de afluentes de agua o zonas húmedas. Usualmente permanece inmóvil, perchedo en una rama, incluso se deja acercar, de ahí el nombre tradicional de bobitos.



Descripción:

La coloración de esta ave es, en su mayor parte, café; la cabeza, cuello y pecho son de color café-rufo, iris rojo, con un borde en la parte exterior del ojo de color blanco y unos característicos bigotes también blancos en la frente (solo el macho), área malar y mentón. La zona dorsal, alas, y rectrices son de color café oscuro, en las alas tiene pequeñas manchas de color *beige*; el abdomen es de color café claro y hacia los flancos presenta un leve estriado.



Preocupación menor



Insectívoro

Alimentación



Ramphastidae

Conocidos comúnmente como tucanes, son aves tropicales de pico y plumaje de colores vistosos, poseen un pico largo que llega a medir hasta la tercera parte de su tamaño, son de talla mediana a grande, alas cortas, pequeñas y redondeadas, cola recta; cuentan con un sentido agudo de la visión y alrededor de sus ojos, en la mayoría de las especies, tienen la piel desnuda, casi siempre de colores vivos. Usualmente encontrado en parejas, son monógamos y se alimentan principalmente de frutos, semillas y, en algunas ocasiones, de huevos y pequeños pichones de otras aves.




Aulacorhynchus haematopygus - Foto: Jorge Arturo Romero

Tucancito esmeralda

Emerald Toucanet

Aulacorhynchus albivitta



Autor de la ficha: Miguel Moreno Palacios.

Foto: Arturo Romero

Etimología:

Aulacorhynchus, pico con surcos, refiriéndose a los picos de tucanes. Proviene del griego *áulax*, surcos, estrias, y *rhyngkos*, hocico, pico. El latín *prasinus* proviene del griego *prásinos*, haciendo referencia al color verde del puerro (práson), una verdura muy conocida desde la antigüedad.

Aspectos ecológicos:

Habita principalmente bosques húmedos montañosos, desde ~1500 m hasta borde de páramo. Es frecuentemente observado en bordes de bosque, pero también en vegetación secundaria y en zonas de arbolado disperso. Su dieta incluye principalmente frutos (p.e. *Cecropia* sp., *Ficus* sp.), pero pueden consumir invertebrados y pequeños vertebrados, hasta huevos de otras aves. Anidan en huecos de árboles, con cuidado parental por ambos padres. Son bastante vocales, produciendo sonidos ronc y repetitivos.

Descripción:

Es un tucán pequeño (30 - 37 cm), de color verde esmeralda con color café rojizo en coberteras infracaudales y extremo de las plumas timoneras, de garganta blanca. Un pico largo, principalmente negro, con una línea blanca vertical en la base y un poco de color rojizo en la mandíbula. Tiene una mancha de color amarillo a lo largo de la parte superior de la maxila. El color de la garganta y la extensión de amarillo en el pico pueden variar entre poblaciones a lo largo de Colombia, de allí la diferencia en las subespecies reconocidas.



Preocupación menor



Insectívoro



Frugívoro




Carnívoro

Alimentación

Tucancito rabi-rojo

Crimson - rumped toucanet

Aulacorhynchus haematopygus



Autor de la ficha: Yolanda Mosos Angarita.

Foto: Arturo Romero

Etimología:

La palabra *Aulacorhynchus* proviene del griego *áulax* y *rhýnkhos* que referencia a un pico con surcos; el epíteto *haematopygus* tiene las raíces griegas *haima* y *pugus*, haciendo referencia a rabadilla color sangre.

Descripción:

De pico bastante grande y rojizo oscuro, delineado de blanco en la base; en general el plumaje corporal es de color verde, algo azulado en el pecho. La cola es larga y verde y en su punta es teñida de rojo, al igual que la rabadilla.

Aspectos ecológicos:

Habita, en general, bosques húmedos, bordes de bosque, aunque se le puede observar atravesando árboles en potreros y otras áreas abiertas. Aunque principalmente presenta una dieta mixta, se le ve consumiendo frutos frecuentemente de árboles de gran porte, en particular de Yarumos (*Cecropia sp.*); puede ser robador de huevos, pichones y preda lagartijas y otros mamíferos pequeños. Puede verse solo o en parejas, emitiendo su canto estereotipado de una nota continua.



Preocupación menor



Endémico



Insectívoro



Frugívoro




Carnívoro

Alimentación

Tucán celeste

Black-billed Mountain-Toucan

Andigena nigrirostris



Autor de la ficha: Miguel Moreno Palacios.

Foto: Carlos A. Guevara

Etimología:

Andigena, que nació en los Andes. Proviene del latín *andium*, Andes. Del latín *genus*, nacimiento, origen; *nigrirostris*, con el pico negro, del latín *niger*, negro, y *rostrum*, cara, hocico, pico.

Aspectos ecológicos:

Una especie icónica de los bosques montañosos húmedos y muy húmedos en los Andes. Frecuenta bordes de bosque, zonas cultivadas en cercanía a los bosques y zonas de arbolado disperso, distribuida entre los 1700 y 2700 m. Observado en parejas o grupos familiares mientras se alimentan. Su dieta no es muy conocida, aunque se tiene registro de frutas, semillas y escarabajos. Anida en cavidades de árboles, pero no se sabe mucho de sus aspectos reproductivos. Es una especie que puede ser reconocida, gracias a sus vocalizaciones, que se asemejan a un traqueteo rápido y repetitivo.



Descripción:

De 50 cm y con un peso de 350 g. Por encima, la coronilla y la nuca son de color negro, el manto es café, las alas son negras, la rabadilla es amarillo claro, la cola es negra con extremos café rojizo. La piel facial desnuda alrededor de los ojos, azul hacia adelante del ojo y amarillo atrás. El pico negro con base y parte de la maxila rojiza. La garganta blanca, pecho y flancos color azul turquesa, café rojizo en muslos. Las plumas infracaudales son rojas.



Preocupación menor



Endémico



Insectívoro



Frugívoro



Carnívoro

Alimentación



Picidae

Aves comúnmente conocidas como pájaros carpinteros y picamaderos; poseen un tamaño de pequeño a mediano. La coloración de su plumaje es diversa, predominando los castaños, verdes, naranjas y negros, muchas especies presentan parches rojos en la cabeza, cuentan con un fuerte y puntudo pico que les permite taladrar la madera de los árboles, para hacer sus nidos y extraer sus alimentos (larvas e insectos). Tras su pico y delante de su cerebro se encuentra un hueso que los protege de los bruscos movimientos realizados al taladrar. Son monógamos y trabajan en pareja para construir sus nidos e incubar los huevos. Como dato curioso pueden picotear hasta veinte (20) veces por segundo.




Veniliornis kirkii - Foto: Jorge A. García

Carpinterito oliváceo

Olivaceous Piculet

Picumnus olivaceus



Autor de la ficha: José Sosa Salgado.

Foto: Santiago Vargas.

Etimología:

Su nombre científico proviene del francés *picumne*, y *olivaceus* proviene del latín. En conjunto significan carpintero pequeño de color verde oliva.

Aspectos ecológicos:

Ave consumidora de insectos de corteza de árboles, observada principalmente en las ramas, buscando y perforando la madera donde detectan su presa. Es normal ver individuos solitarios o en pareja. Usualmente se observan en áreas abiertas con árboles, cultivos, bosques o bordes de bosque. En ocasiones se ubican por su martilleo leve sobre ramas de árboles o por su canto en forma de trino agudo descendente.



Descripción:

Muy pequeñito, pico pequeño, puntiagudo y fino. La corona es negra, punteada de rojo hasta la parte media donde comienza y se entremezcla un punteado blanco, extendido hasta la nuca. La espalda es verde oliva, igual que las alas, las que presentan los bordes de sus plumas más claras; el pecho y demás partes por debajo también son verde oliva, pero con estriado de amarillo oliva desde la parte baja del pecho hasta el vientre bajo.




Alimentación

Carpintero habado

Red-crowned woodpecker

Melanerpes rubricapillus



Autor de la ficha: Marta Lucía Arbeláez.

Foto: Miguel Moreno

Etimología:

Su nombre significa trepador negro con corona roja. *Melanerpes* deriva del griego *melas* que significa negro y *herpes* referido a trepador; *rubricapillus* proveniente del latín *ru-* *ber* que significa rojo y *capillus*, cabello.

Aspectos ecológicos:

Se distribuye en gran diversidad de hábitats como bosques semiabiertos, cultivos, bosques secundarios y, en general, en áreas abiertas, incluyendo la ciudad. Es muy conspicuo, normalmente solitario o en parejas, alimentándose de artrópodos, algunas veces frutos, visitando inclusive comederos de banano o plátano. Construyen su nido en árboles secos donde realizan uno o varios huecos para anidar y conseguir pareja, utilizando inclusive guaduas, en donde consume comejenes (Obs. L Devia).

Descripción:

Es el carpintero más común y fácil de observar. Presenta corona de color rojo que se extiende hasta la nuca, su pico tiene forma de cincel y es de color negro. Su espalda y alas son de color negro barrado con blanco; la cola es blanco con negro. La hembra es similar al macho, pero la corona es de color beige.

Las demás partes por debajo de color crema, teñida de anaranjado en el área ubicada entre los muslos; estos últimos y las infracaudales con manchas negras con fondo claro.



Preocupación menor




Alimentación

Carpintero real listado

Lineated woodpecker

Dryocopus lineatus



Autor de la ficha: Diba Andrade.

Foto: Gissela Sánchez

Etimología:

El género *Dryocopus* es proveniente del griego *drūkōpos*, que hace referencia a carpintero; el epíteto *lineatus* es una palabra en latín que refiere a marcado con líneas, que en este caso son barras en el vientre.

Descripción:

Presenta una pronunciada cresta roja en su coronilla, el resto de la cabeza, dorso, alas y rectrices son de color negro, tiene dos líneas laterales de color blanco que van desde el pico hasta la zona media del dorso; en el pecho y abdomen presenta un color crema, sobre el cual tiene un patrón de barras negras horizontales. La hembra es similar al macho, exceptuando su frente y bigoteria que son de color negro.

Aspectos ecológicos:

Es el carpintero de mayor tamaño visto en el Tolima en zonas bajas a medias, hasta los 2300 m s. n. m. Se reconoce fácilmente por su tamaño, fuerte canto y tamborileo, asociado principalmente a bordes de bosque, zonas abiertas arboladas, desde parques, zonas de cultivo y, en general, paisajes rurales y áreas periurbanas. Se alimenta principalmente de insectos que encuentra en la corteza, como coleópteros, hormigas y similares.



Preocupación menor




Alimentación

Carpintero buchipecoso

Spot-Breasted Woodpecker

Colaptes punctigula



Autor de la ficha: Ángela Merchán.

Foto: Gissela Sánchez

Etimología:

Su nombre general significa cincelador con parche en la garganta; proviene del griego *kolaptes*, que significa cincelador y *punctigula* del latín *punctum* y *gula*, que significan, respectivamente, parche y garganta.

Aspectos ecológicos:


Este carpintero tiene gran distribución a lo largo del país hasta 1500 m. Frecuenta bosques intervenidos, en zonas abiertas con pocos árboles; se puede observar también en la ciudad. Se alimenta solo de insectos y es muy casual verlo en el suelo o cerca al suelo cazando hormigas en parejas o solo.



Descripción:

Presenta una máscara blanca, con coronilla, nuca roja y frente negra. El pico negro con la garganta blanca, barrada de negro. La espalda es amarillo oliva oscuro con un barrado negro; las partes inferiores son de color amarillo oliva claro con puntos negro, que se extienden desde el pecho hasta el abdomen.

La hembra es similar al macho, excepto, que esta presenta el negro de la frente, más extendido hacia atrás (occipucio) y carece de bigotera roja.



Preocupación menor



Alimentación

Falconidae

Esta familia incluye a las aves conocidas como halcones, cernícalos y caracaras. Son aves de presa de tamaño mediano, poseen fuertes garras, pico ganchudo que, en conjunto, le permiten desgarrar sus presas. Con ojos situados lateralmente poseen un excelente sentido de la visión, con el que identifican su alimento a gran distancia, el cual, usualmente, son aves y pequeños mamíferos capturados al vuelo, llegando a ellos desde grandes alturas. Los plumajes son usualmente marrones, castaños y grises.




Falco sparverius - Foto: Jeyson Sanabria Mejía

Guaraguaco común

Crested caracara

Caracara Cheriway



Autor de la ficha: Juan Felipe del Castillo Téllez.

Foto: Lus Eduardo Urueña

Etimología:

Caracara proviene de *caracará* de la lengua tupi, referido a un tipo de ave rapaz para algunas comunidades indígenas brasileras; por otra parte, *cheriway* corresponde al nombre que ciertos grupos indígenas caribes de Venezuela le otorgan a esta especie.

Aspectos ecológicos:

Estas aves omnívoras son muy comunes en gran parte de Colombia, principalmente asociadas a tierras ganaderas, áreas abiertas y bordes de bosque hasta los 3000 m s. n. m.; donde se alimentan de animales muertos, insectos e, incluso, pueden cazar pequeños vertebrados como ranas, serpientes, lagartijas y roedores. Se observan comúnmente en el suelo o perchedos en árboles, en pareja o en grupos, algunas veces en las carreteras consumiendo animales atropellados.

Descripción:

Tiene una cresta negra con capucha, con los lados de la cabeza color blanco crema junto con el cuello, extendiéndose hasta el pecho y manto, donde tiene unas manchas negras. Presenta piel facial amarillenta con cera roja, el pico es robusto, con la base azulada y la punta blanca. La base de las plumas primarias de las alas es blanca, rayada con marrón; las coberteras supra caudales y la base de la cola son coloreadas de blanco, rayado de marrón oscuro con la punta de la cola negra. El resto de sus partes son negras, sin contar las patas que son amarillas.



Preocupación menor



Insectívoro



Frugívoro



Carnívoro




Carroñero

Alimentación

Garrapatero

Yellow-headed caracara

Milvago chimachima



Autor de la ficha: Lucelia Triana Sánchez.

Foto: Jorge García Melo

Etimología:

La palabra *Milvago* proviene del latín *milvus*, referido a Milano y *chimachima*, que es el nombre vulgar (onomatopeya) de caracara en una región particular de Argentina.

Descripción:

En general posee una coloración crema en gran parte del cuerpo; las alas son café oscuro, al igual que una ciliar fina después del ojo. La cola con barras alares delgadas de color café oscuro, con una barra terminal más ancha. Lore y alrededor del ojo desnudo con piel amarilla, coloración que se extiende hasta la parte media de pico, después de la narina; el resto del pico es gris azulado. En vuelo presenta parches alares blancuzcos.

Aspectos ecológicos:

Especie frecuente en el municipio de Ibaigui, sobre todo en áreas abiertas, cultivos en la zona baja, potreros y, a veces, en la ciudad en parques o lotes baldíos.

De hábitos omnívoros, puede consumir una variada gama de vertebrados desde ranas hasta polluelos de otras aves, incluso se puede ver consumiendo animales muertos, con frecuencia animales atropellados; se ha reportado también el consumo de serpientes. Su canto es un chillido fuerte y estremeceador.



Preocupación menor



Insectívoro



Frugívoro



Carnívoro




Carroñero

Alimentación



Psittacidae

Esta familia incluye a las aves tropicales conocidas como guacamayas, loros, pericos y cotorras. Por lo general, viven en zonas cálidas, pero también en menor proporción algunas de zonas altas. Son consideradas unas de las aves más inteligentes, muchas especies de esta familia pueden imitar la voz humana y otros sonidos; poseen plumajes con coloraciones vistosas dentro de los que resaltan el verde, azul, rojo y amarillo. Su alimentación se basa en bayas y frutos, aunque no son dispersoras de semilla, ya que usualmente la destruyen o la afecta. Son aves frecuentemente usadas como mascotas; pueden vivir de cincuenta (50) a sesenta (60) años, aunque en cautiverio esta cifra disminuye.




Amazona amazónica - Foto: Jorge García Melo

Periquito bronceado

Orange-chinned Parakeet

Brotogeris jugularis



Autor de la ficha: Gissela Sánchez Castiblanco.

Foto: Miguel Moreno Palacios

Etimología:

Del griego *brotogerus*, de voz humana y del latín *jugularis*, de garganta.

Aspectos ecológicos:

Periquito muy bulloso, que mantiene en bandadas en diversas zonas como bosques tupidos, secundarios y de galería, bordes de bosque, áreas cultivadas y urbanas. Se alimenta de frutos, semillas y flores; se ha observado alimentándose de flores semiabiertas de Balso (Obs. L. Ospina). Anida en huecos de los árboles, ya sea abandonadas por otras aves o termitas. Tiene un vuelo corto e irregular, cambiando de dirección de manera constante.



Descripción:

Periquito de 18 cm, color verde amarillento, con matices azulado en las plumas primarias de las alas y una amplia mancha de color bronce en el hombro. Cola particularmente corta y en punta. Ojo café oscuro rodeado por un amplio margen de piel blanquecua. Por debajo del pico presenta una coloración anaranjada difícil de ver a gran distancia. El pico es rosado parduzco.



Preocupación menor



Granívoro




Frugívoro

Alimentación



Periquito de anteojos Spectacled parrotled *Forpus conspicillatus*



Autor de la ficha: Carlos Alfonso Guevara Colmenares.

Foto: David Sánchez

Etimología:

Su nombre proviene del latín *conspicillum*, con gafas, y el nombre *forpus* fue puesto sin ningún significado aparente.

Aspectos ecológicos:


Son los periquitos más comunes y fáciles de reconocer, son gregarios, usualmente formando bandadas de gran tamaño. En general son bastante ruidosos, se pueden ver en medio de la ciudad, en zonas semiabiertas y cultivos, se alimentan de semillas de pastizales, brotes foliares y flores de arbustos.



Esta especie presenta dimorfismo sexual. El macho tiene la cabeza, mejillas y garganta de color verde amarillento, con una mancha de color azul alrededor del ojo y pico color marfil. El resto de las partes del cuerpo son de color verde, con azul violeta en las coberteras inferiores y superiores y la rabadilla. La hembra es de color verde brillante y no presenta ocular azulado.



Preocupación menor



Granivoro




Frugivoro

Alimentación

Perico chocolero

Scarlet - fronted parakeet

Psittacara wagleri



Autor de la ficha: Yolanda Mosos Angarita.

Foto: Jorge García Melo

Etimología:

La palabra *Psittacara* proviene de la raíz griega *psittake*, referida a loro, y *kara* a cabeza. El epíteto *wagleri* fue otorgado en honor al naturalista alemán Johann Wagler.

Descripción:

Es un perico mediano, estilizado y de cola larga con punta fina, amarillo oliva por debajo y verde por encima. En general el plumaje es de color verde, más amarillo ventralmente, con la frente, parte de la corona y algunas manchas irregulares en el cuello de color rojo; el pico es gancho de color crema claro. Los juveniles presentan en la frente, una menor área en rojo.

Aspectos ecológicos:

Se alimenta de frutas y semillas, en bosques secos y húmedos. Como todos los psitaciformes son bastante ruidosos y, por lo general, en bandadas o en parejas en época reproductiva. Se han observado migraciones altitudinales en ciertas estaciones, principalmente en verano, desde zonas bajas de la meseta a zonas más húmedas en la zona periurbana de la ciudad de Ibagué.



Granívoro



Frugívoro

Alimentación



Thamnophilidae

Conocidos como batarás y hormigueritos, son aves tropicales y sub-tropicales de América Central y del Sur. Son de tamaño pequeño, alas redondeadas, plumajes de coloraciones principalmente blancas, negras, grises y castañas. Se alimentan generalmente de insectos, u otros artrópodos y pequeños vertebrados; son monógamos, ambos padres incuban, cuidan a los huevos y alimentan a sus crías.




Thamnophilus doliatus - macho - Foto: Rossmayra Marulanda Bejarano

Batará carcajada

Bar-crested Antshrike

Thamnophilus multistriatus



Autor de la ficha: Beatriz Méndez Cubillos.

Foto: Gissela Sánchez

Etimología:

El género *Thamnophilus* proviene de las raíces griegas, *thamnós* y *phílos*, referido a amigo de la maleza, respectivamente. El epíteto *multistriatus* se deriva del latín *multi* y *striatus*, para referirse a que tiene muchas franjas en su cuerpo.

Descripción:

El macho es completamente barrado de blanco y negro; iris amarillo y pico negruzco. La hembra, a diferencia del macho, presenta la coronilla, espalda, alas y cola de color rufo.

Aspectos ecológicos:

Usualmente se distribuyen por encima de los 1000 m s. n. m., en bosque húmedos, principalmente en bordes de bosque en estratos medios y altos; algunas veces en jardines y áreas de cultivo en zonas rurales. Con frecuencia en pareja, cantando en dueto, pueden verse siguiendo hormigas soldados o cazando artrópodos, principalmente; altamente territoriales, responden agresivamente ante la presencia de otros machos.



Preocupación menor



Endémico




Insectívoro

Alimentación

Batarito cabecigrís

Plain Antvireo

Dysithamnus mentalis



Autor de la ficha: Yair Guillermo Molina Martínez.

Foto: Miguel Moreno Palacios

Etimología:

La palabra *Dysithamnus* proviene del griego *dýō* (sumerge) y *thamnos* (monte, arbusto), para referirse a que el ave es de interior de sotobosque; el epíteto *mentalis*, que proviene del latín *mentum*, significa mentón.

Aspectos ecológicos:

Especie típica de interior del bosque, dependiente de este, habita frecuentemente en bosques húmedos y bosques secundarios, se puede encontrar entre los 600 y los 2200 m s. n. m.. Se alimenta especialmente de insectos, que forrajea principalmente en el sotobosque. Aunque difícil de ver, por su coloración críptica y que gusta de sitios oscuros, se puede reconocer con cierta facilidad por su canto en forma de carcajada pausada ascendente y luego descendente.



Descripción:

Ave de tamaño pequeña, cabeza redondeada y grande, cola corta. El macho presenta una coloración gris en la frente y en los laterales de la cabeza, el resto de la cabeza es oliváceo oscuro; en sus alas presenta dos barras blancas, el abdomen es amarillo pálido, pecho gris pálido y una mancha blanca oculta en el hombro. Las hembras presentan un anillo ocular blanco, frente y coronilla rufa, los laterales de la cabeza son grisáceos, y su abdomen es amarillo pálido. Tanto hembras como machos presentan mandíbula y patas grises.



Preocupación menor




Alimentación

Ibagué, entre alas, colores y cantos

Hormiguero ventriblanco

White-bellied Antbird

Myrmeciza longipes



Autor de la ficha: Diego Carantón-Ayála.

Foto: Luis Eduardo Urueña

Etimología:

El nombre científico completo de la especie significa "emboscador de hormigas de patas largas", primero por las raíces griegas *mýrmēx*, que se relaciona a hormiga; e *ízo*, asociado a la acción de emboscar, seguir, sitiar, y la palabra del latín *longipes*, que indica patas largas.

Aspectos ecológicos:

Esta especie se mueve en el suelo del bosque, para esto le son de gran utilidad sus patas fuertes, es insectívoro y se alimenta de una amplia variedad de insectos y otros invertebrados, es un habitante de los relictos de bosque seco tropical, presentes en el valle del Magdalena en el Tolima. Es difícil de observar, pero su canto característico nos permite confirmar su presencia en la zona.

Descripción:

Este hormiguero es bastante llamativo y presenta dimorfismo sexual. Por ser un hormiguero tiene un pico fuerte, mediano y ligeramente ganchudo en la punta. Mide de 14 a 15 cm, cabeza grisácea con una ceja gris clara y una coloración café rojiza en el dorso, alas y las partes superiores. El vientre es blanquecino con los flancos y debajo de las alas color crema y las patas rosadas. Los machos tienen la cara, garganta y pecho negro, dando la forma de un barbero oscuro; la hembra carece de esta tonalidad negra y la garganta y pecho son color café castaño claro.



Preocupación menor



Insectívoro

Alimentación




Grallariidae

Esta familia se compone de las aves Neotropicales conocidas como gralarias y tororois. Poseen gran variedad en sus tamaños, son usualmente de cuerpo grueso, cola corta y patas largas, plumajes grisáceos y castaños. No muestran dimorfismo sexual, son terrestres, es decir que no vuelan como tal y más bien se observan corriendo o caminando en el suelo. Pueden, ocasionalmente, subir a ramas de árboles pequeños. En general son muy difíciles de ver, pero se detectan con facilidad por sus cantos, habitualmente más frecuentes en las mañanas. Se alimentan principalmente de lombrices, insectos grandes y rara vez de vertebrados.



Grallaricula nana - Foto: Luis Eduardo Urueña

Tororoí seco estoy Chestnut-crowned Antpitta *Grallaria ruficapilla*



Autor de la ficha: Yair Guillermo Molina Martínez.

Foto: Luis Eduardo Urueña

Etimología:

El género, como se mencionó, se refiere a caminante en zancos y el epíteto *ruficapilla* se deriva del latín *rufus* y *capillus* para referirse a que la cabeza está cubierta de color rufo.

Descripción:

Ave corredora grande, posee una coloración rojo castaño en la coronilla, nuca y laterales de la cabeza; la espalda, las partes superiores café oscuro oliváceas y la garganta son blancas. Partes inferiores café oliva oscuro escamado en estrías de blanco, siendo blanco total en la parte central; las patas son gris azuladas. El pico es negruzco en la mandíbula superior y gris azulado en la inferior; anillo ocular fino, de piel desnuda gris azulado.

Aspectos

ecológicos:

Se distribuye entre los 1900 y los 3100 m s. n. m., en bordes de bosque o en el interior de bosques húmedos, en el suelo o cerca de este; algunas veces en chuscales o matorrales en vegetación secundaria cerca al bosque. Es el tororoí más escuchado y visto en paisajes rurales del Tolima. Se alimenta principalmente de lombrices, insectos y pequeños vertebrados; de comportamiento agresivo, responde fácilmente al *play back* dejándose avistar, incluso imitando su canto a punta de silbido, el cual pareciera decir *seco – estoy*.




Alimentación

Tororoí chusquero

Chestnut-naped Antpitta

Grallaria nuchalis



Autor de la ficha: Yair Guillermo Molina Martínez.

Foto: Luis Eduardo Urueña

Etimología:

La palabra *Grallaria* proviene del latín moderno *grallarius* que se refiere a caminante en zancos, ya que las especies de este género tienen patas muy largas diseñadas para correr y caminar en el suelo del sotobosque. El epíteto *nuchalis* es una palabra del latín moderno que significa nuca, para resaltar que en esta especie se destaca la nuca, en este caso castaño.

Aspectos ecológicos:

Habita principalmente en el suelo, en matorrales y cháscales de bordes de bosques e interior de selvas húmedas hasta los 3000 m s. n. m.; se alimenta principalmente de insectos y lombrices. Difícil de ver, aunque sea estimulada con *play back*, al cual responde agitadamente con su canto, de aproximadamente 10 notas, a la misma frecuencia con un ritmo que se acelera con cada nota. Puede ser cebada con lombrices.

Descripción:

Ave corredora de tamaño grande, cabeza grande y redondeada con anillo ocular grisáceo, aparentemente de piel desnuda; patas largas y grises, nuca castaña, garganta y auriculares castaño oscurecido, abdomen y partes inferiores gris oscuro, partes superiores castaño rojizo.




Alimentación

Tororoí de Miller

Brown-banded Antpitta

Grallaria milleri



Autor de la ficha: Yair Guillermo Molina Martínez.

Foto: Luis Eduardo Urueña

Etimología:

El género como se mencionó se refiere a caminante en zancos y el epíteto *milleri* se hace en honor al colector norteamericano Leo E. Miller, quien participó en las expediciones de Chapman y fue uno de los colectores de los especímenes tipo usados para describir la especie.

Aspectos ecológicos:

Especie endémica de la cordillera Central, la cual se distribuye entre los 2000 y los 3000 m s. n. m., principalmente en el interior de bosques húmedos, en el suelo de sotobosques enmarañados, algunas veces en chuscales o matorrales en vegetación secundaria en claros dentro del bosque. Es un tororoí difícil de ver, aunque responde agresivamente al *play back*; se reconoce fácilmente por su canto de tres notas sucesivas que aumentan gradualmente de frecuencia. Es susceptible al condicionamiento para la observación con cebo de lombrices.

Descripción:

Especie corredora de patas largas gris azuladas; en general la coloración es café oliva más oscurecida en el dorso y alas. Garganta blanca hasta el pecho alto, en donde se presenta una banda gruesa café oliva oscura a canela que se degrada a blanco grisáceo en la zona central hacia parte abdominal, manteniéndose en los flancos el café oliva. Pico gris negruzco, anillo ocular fino, de piel desnuda gris azulado a rosado negruzco y con banda loreal difusa café claro.



Vulnerable



Endémico



Insectívoro

Alimentación



Rhinocryptidae

Aves conocidas como tapaculos, gallitos y churrines. En general poseen un tamaño de pequeño a mediano, son aves terrestres poco voladoras, cuentan con alas cortas y redondeadas, patas, cola corta y pico puntiagudo; la coloración de su plumaje es generalmente grisáceo y castaño. Se alimentan principalmente de insectos y arañas, aunque algunas especies también lo hacen de bayas.




Scytalopus atratus - Foto: Miguel Moreno Palacios

Tapaculo cabeziblanco

White-crowned Tapaculo

Scytalopus atratus



Autor de la ficha: Yair Guillermo Molina Martínez.

Foto: Miguel Moreno Palacios

Etimología:

El género *Scytalopus* se deriva del griego *skutalē*, que hace referencia a pies en forma de rama, básicamente por las patas fuertes y gruesas, características del género; por otro parte, el epíteto *atratus*, como palabra latina, se refiere a vestido de luto, por la coloración general negra de la especie.

Aspectos ecológicos:

Distribuido generalmente entre los 1100 y los 2000 m s. n. m.; habita el sotobosque y los bordes de bosques montanos y húmedos. Son difíciles de observar porque gusta de matorrales enmarañados y oscuros; a pesar de que responde fuertemente a *play back*, rara vez se logra visualizar. Se reconoce fácilmente por su canto, que consiste en ocho o nueve notas iguales repetitivas, intercaladas con espacios de silencio entre cantos.

Descripción:

Ave pequeña, rechoncha y, en general, coloreada de negro grisáceo oscuro. Pico negro y pequeño, con un parche blanco en la coronilla; desde más abajo del pecho bajo presenta un escamado blanquizco que se degrada a castaño desde las tibias hasta las infra-caudales, barreteado de negro. A nivel supra-caudal también es castaño con barreteado negro. Las patas son rosadas a grisáceas olivas.



Alimentación



Furnariidae

Aves propias de América del Sur y América Central, conocidas como trepatroncos, trepadores y rastrojeros. Son usualmente de alas cortas y redondeadas, cola alargada con plumas con raquis reforzados, que le ayudan a adherirse al tronco al trepar. Son típicamente de plumajes marrones, cafés y castaños con escamas, lágrimas o estrías, usualmente de tonos claros. Se alimentan de pequeños insectos, aunque algunas especies también ingieren lombrices y pequeñas arañas.




Xenops minutus - Foto: Jorge García Melo

Trepatroncos pardo

Plain-brown Woodcreeper

Dendrocincla fuliginosa



Autor de la ficha: Rossmayra Marulanda Bejarano.
Foto: Luis Eduardo Urueña / Miguel Moreno Palacios

Etimología:

Su nombre *Dendrocincla* deriva de la raíz griega *dendron* (árbol) y del latín moderno *cinclus* (tordo), para hacer referencia a tordo de los árboles. El epíteto *fuliginosa* proviene del latín *fuliginosus*, haciendo referencia a sucio o con hollín.

Aspectos ecológicos:

Trepa por los troncos y ramas, comúnmente encontrado en bosques húmedos y muy húmedos de tierras bajas y piedemontes, así como en bosques de niebla, bosques de galería y, ocasionalmente, en manglares. Se alimenta principalmente de artrópodos, hormigas y vertebrados pequeños; se distribuye hasta los 1500 m s. n. m.

Descripción:

Ojos café amarillento, plumaje de marrón oscuro a oliváceo en las partes superiores, claro en las partes bajas y rufas sobre las plumas primarias y rectrices. La garganta es de color gris, patas de negras a gris, pico negro con base y bordes blancuzcos. A diferencia de otros trepatroncos, este carece de rayas o estrías notorias.




Alimentación

Trepador rayado

Black-banded Woodcreeper

Dendrocolaptes picumnus



Autor de la ficha: Rossmayra Marulanda Bejarano.

Foto: Miguel Moreno Palacios

Etimología:

Dendrocolaptes se deriva de las palabras griegas *déndron* y *koláptō*, las cuales hacen referencia a árbol y picotea, respectivamente, es decir que picotea el árbol; el epíteto *Picumnus* es una palabra en latín que hace referencia a un carpintero.

Aspectos ecológicos:

Normalmente visto en solitario o en parejas bien separadas, trepan troncos y ramas en busca de pequeños insectos como grillos, arañas, hormigas, escarabajos, abejas y orugas; habita principalmente en selva húmeda o bordes, ocasionalmente plantaciones en forestales, se distribuye desde los 1300 hasta los 2800m s. n. m. Emite un fuerte canto complejo consistente de varias notas muy rápidas que van disminuyendo de frecuencia lentamente.

Descripción:

Ojos café oscuro, pico negro, largo y recto, con superciliar escamada de color crema; plumaje marrón más oscuro por encima; pecho bajo y vientre barrado. Cabeza, garganta baja y pecho alto con escamas o gotas listadas de color crema; alas, cola y rabadilla de color rufo castaño. Las patas son gris verdoso.




Alimentación

Trepatroncos pico de lanza

Straight-billed Woodcreeper

Dendroplex picus



Autor de la ficha: Juan Felipe del Castillo Téllez.
Foto: Luis Eduardo Uruña / Miguel Moreno Palacios

Etimología:

Su nombre *dendroplex* se deriva del griego *plex* y *dendron* que significa que golpea el árbol, y *picus* con su pico.

Aspectos ecológicos:

Habita en las tierras bajas de los bosques húmedos, bosque seco hasta en áreas degradadas y cerca de espejos de agua, hasta los 1100 m s. n. m. Se pueden observar solo o en bandadas mixtas, forrajeando insectos que encuentra en la corteza de los árboles. Se ha reportado anidando en guaduas usadas como cerca, usando como orificio de entrada la parte superior y entrando en reversa al nido, al parecer profundamente (+/- 70 cm).



Descripción:

Su cabeza hasta la nuca es color café oscuro con estrías muy finas blancas; presenta lista superciliar muy difuminada blanquecina, el dorso y alas son de color marrón y la cola marrón castaño, su pico es recto, afinado y color claro, de garganta blanca. El pecho es escamado con bordes negros y el resto de sus partes inferiores son color marrón.




Alimentación



Guadañero rojizo

Red-billed scythebill

Campylorhamphus trochilirostris



Autor de ficha y foto: José Sosa Salgado.

Etimología:

Del griego *kampýlos* y *rhámphos*, que significa pico curvo; del latín *trochilus* y *rostris*, con cara de colibrí.

Descripción:

Su pico es largo y curvo, de color rojizo. La cabeza, cuello y espalda de café rojizo con estrías finas de color crema, más gruesas alrededor del ojo y la superciliar. Por debajo es café con garganta alta crema y estrías del mismo color que se adelgazan hacia abajo; las alas y la cola son rufas, particularmente esta última presenta plumas con raquis fuertes, las cuales son utilizadas como soporte en el ascenso en los árboles.

Aspectos ecológicos:

Son típicamente insectívoros de corteza, principalmente aquellos ubicados en los vértices de las ramas, bromelias y hojas secas en acumulaciones de detritos. Frecuente en áreas abiertas, siempre cercanas a áreas boscosas y guaduales, incluyendo la zona urbana; usualmente es solitario en sus desplazamientos. En la RNSC Gaia se registró anidando en una guadua con entrada por la parte superior de la misma, en una cerca alrededor de la vivienda. Debido al largo del pico, se observó que para ingresar lo hacía atrás. Se alimenta de insectos de corteza, pero también se puede ver en el suelo consumiendo lombrices de manera oportunista.




Alimentación

Trepatroncos campestre

Streak-headed Woodcreeper

Lepidocolaptes souleyetii



Autor de la ficha: Nicolás Vargas Sánchez.

Foto: Miguel Moreno Palacios / Rossmayra Marulanda

Etimología:

Del griego *lepis* que significa cola escalada y *colaptes* de trepador. *Souleyetii* en honor del zoólogo François Louis Auguste Souleyet.

Aspectos ecológicos:

Habita en bosques, bordes de bosque y zonas de jardines o de cultivos, donde se usan árboles como sombrío. Es frecuente verlo recorrer los troncos y axilas de los árboles, desplazándose de abajo hacia arriba, girando alrededor del tronco. Come insectos que encuentra entre líquenes, musgos y cortezas de los árboles, al igual que en plantas epífitas.



Descripción:


Trepatroncos de 20 cm. En general de color café oscuro, con la garganta y mentón de color crema blancuzco de donde salen estrías gruesas bordeadas de negruzco extendidas ventralmente hasta las infracaudales. Cabeza café oscuro con superciliar crema blancuzco extendido casi hasta la nuca; pequeñas escamas filamentosas también crema blancuzca en gran parte de la cabeza. Alas, supracaudales y cola de color rufo. El pico es curvo, medianamente largo y de color rosado blancuzco; patas gris negruzcas a amarillo oliva oscuro.



Alimentación



Saltarrocas punteado Sharp-tailed Streamcreeper *Lochmias nematura*



Autor de la ficha: Orlan David Vargas Díaz.

Foto: Rossmayra Marulanda

Etimología:

El término *lochmias* proviene del griego *lókhmios* que significa bosque o espesura, y *nematura*, con cola de hilo o delgada.

Descripción:

Hojarascero de 15 cm, con corona, espalda y alas de color marrón. Iris café oscuro, pico principalmente negro, largo y curvado levemente en el extremo. La garganta, pecho y abdomen con plumas blancas bordeadas de negro simulando gotas o escamas. La cola corta de color negro.

Aspectos ecológicos:

Prefiere zonas oscuras cercanas a riachuelos donde se desplaza por el sotobosque cerca al suelo, lo que dificulta su observación. Construye el nido en túneles escavados, usualmente en taludes. Busca insectos y otros artrópodos cerca al agua y suelo, entre el musgo y la hojarasca.




Alimentación

Hojarasquero oliváceo

Buff-throated Foliage-gleaner

Automolus ochrolaemus



Autor de la ficha: Yair Guillermo Molina Martínez.

Foto: Luis Eduardo Urueña

Etimología:

La palabra *automolus* proviene del griego *utómolos* que significa solitario o desertor; el epíteto *ochrolaemus* proviene de las raíces griegas *ōkhros* (amarillo pálido) y *laimos* (garganta) para referenciar garganta amarilla pálida.

Aspectos ecológicos:

Se distribuye por debajo de los 1200 m s. n. m., frecuentemente en selvas húmedas y pluviales, bosques secundarios y bordes de bosque cerca de ríos y quebradas; se alimenta principalmente de insectos y pequeños vertebrados. Son difíciles de observar por su desplazamiento rápido y preferencias de sotobosques cerrados y oscuros; no obstante, su canto en forma de chillido con notas decrecientes permite su fácil ubicación e identificación.




Descripción:

Tanto hembras como machos presentan características morfológicas similares; la cabeza es de color marrón con un anillo ocular y una leve superciliar de café claro. El dorso y las alas son marrón oscuro; por debajo es marrón claro desde el pecho alto hasta las infracaudales. La garganta es amarillo crema, pecho con leves estrías café claro; cola de color rufo y patas verdes oliváceas.



Alimentación

Chamicero pizarra Slaty Spinetail *Synallaxis brachyura*



Autor de la ficha: José Sosa Salgado.

Foto: Miguel Moreno Palacios

Etimología:

Synallaxis, palabra proveniente del latín moderno que significa rastrojero, y *brachyís*, de cola corta.

Descripción:

Presenta un pico corto fuerte, la cabeza la cubre una capucha rufa hasta la nuca, las alas son igualmente rufas, la frente es gris al igual que la mejilla, la garganta y el pecho; el abdomen es gris claro, la cola es café y típicamente se observa filamentos por el intenso desgaste.

Aspectos ecológicos:

Insectívoro de estratos bajos, principalmente en matorrales, rastros, bordes de bosque enmarañados y áreas recién desmatonadas con pastos y chamizas secas. Se han registrados diferentes nidadas en arbustos de café, de los cuales obtiene los *palitos* delgados para construir su nido, el cual es un montón ordenado y bien dispuesto de palitos de hasta 20 cm de largo, la pareja los corta de las ramas extremas y delgadas del café, transporta y organiza en una estructura más o menos globular (dimensiones: largo = 40 cm, ancho = 22 cm y alto 30 cm), con un pórtico para percharse y entrar. Son muy activos a cualquier hora del día, reconociéndose fácilmente por su continuo canto.




Alimentación

Rastrojero pálido

Pale-breasted Spinetail

Synallaxis albenscens



Autor de la ficha: Jeniffer Andrea Domínguez Vargas.

Foto: Jorge García / Miguel Moreno Palacios

Etimología:

El género *Synallaxis* proviene del francés *synallaxe*, el cual fue usado por Vieillot (1818) para referirse a las especies de este género; el epíteto *albescens* proveniente de la raíz latina *albesco* para referirse a que su pecho se degrada a blanco.

Descripción:

En general de color café-marrón por encima, con un parche rufo en la nuca y corona; lados de la cara café oliva claro. La cola y las alas están teñidas de café oliva oscuro, con un parche contrastante de color rufo en los hombros. La garganta y el pecho son de color blancuzco, que se extiende ventralmente por todo el centro y se degrada a café oliva claro hacia los flancos. Como en otras especies de este género la cola es larga y muy desgastada en los ápices.

Aspectos ecológicos:

Distribuido generalmente en zonas bajas por debajo de los 2000 m s. n. m.; habita principalmente áreas abiertas asociadas principalmente a matorrales, dehesas y bordes de bosque enmarañados, desde zonas urbanas, cultivos, pastizales altos hasta bosques secundarios o vegetación en crecimiento. Su alimentación se basa principalmente de insectos. Fabrica su nido en forma de tubo largo y con gran variedad de ramitas y palitos.




Alimentación



Pipridae

Aves neotropicales conocidas como saltarines, bailarines y manaqués; son de tamaño pequeño, poseen un cuerpo compacto, pico ancho y corto, alas y cola corta en la mayoría de las especies. Muestran notorio dimorfismo sexual; los machos presentan plumajes coloridos, mientras que las hembras son opacos y poco llamativos. Habitan al interior de los bosques y se alimentan principalmente de bayas y pequeños insectos. Los miembros de esta familia generalmente presentan particulares rituales de apareamiento llamados *leks*, los cuales son agrupaciones de machos compitiendo por las hembras; pueden crear sonidos con sus alas (estridulación), utilizados para el cortejo, acompañados de saltos y movimientos extravagantes.




Chloropipo flavicapilla - Foto: Miguel Moreno Palacios

Saltarín coludo

Lance-tailed manakin

Chiroxiphia lanceolata



Autor de la ficha: Ángela Merchán.

Foto: Miguel Moreno Palacios

Etimología:

Su nombre, en general, significa saltarín cola de lanza; *Chiroxiphia* deriva del griego *kheir*, que traduce mano y *xiphos*, espada. *Lanceolata* proviene del latín lanceolatus que significa con forma de lanza.

Aspectos ecológicos:

Este saltarín es difícil de observar, pero fácil de identificar ya que es muy vocal, aunque es más factible de ver en épocas de reproducción, ya que los machos forman leks entre la parte media y alta de sotobosque, realizando despliegues para atraer la hembra. Habita en el bosque húmedo y seco tropical, prefiere el sotobosque donde se alimenta principalmente de frutos.



Descripción:

El macho presenta una coronilla roja que se cresta, dependiendo de su estado de ánimo; pico negro, ojos de café rojizo oscuro. La mayor parte de su cuerpo es negro hollín, excepto un parche azul que presenta en la espalda y escapulares. Particularmente, las rectrices presentan las plumas centrales que tiene forma lanceolada y más largas que el resto; tiene patas anaranjadas. La hembra es de color verde oliva, pero más amarillo pálido en garganta y vientre, con coronilla roja y cola de forma similar al macho.



Insectívoro




Frugívoro

Alimentación

Saltarín barbiblanco

White-bearded Manakin

Manacus manacus



Autor de la ficha: Diba Andrade.

Foto: Miguel Moreno Palacios

Etimología:

El origen de la palabra *manacus* es confuso, se ha atribuido a la manera de llamar en inglés *manakin* a los saltarines (Pipridae), no obstante, también puede derivar de *mannakin* de Holanda, de Surinam e, incluso, se cree que proviene de un dialecto indígena amazónico *manaquim*.

Aspectos ecológicos:

El saltarín barbiblanco se distribuye en Colombia hasta los 1900 m s. n. m.; habita bosques secos a húmedos, a nivel del sotobosque, forrajeando pequeñas frutas e insectos. En particular, forman grupos sociales de exhibicionismo de machos, para atraer a las hembras, en lo que se conoce como *leks*, en donde el macho danza, saltando de una rama a otra y emitiendo sonidos con las alas (estridulación), de ahí que en algunas regiones son conocidos como tira pedos.



Descripción:

El macho tiene la cabeza de color blanca, a excepción de la coronilla que es negra, al igual que el pico, la parte superior del dorso, alas y rectrices. La garganta hasta pecho bajo es de color blanco, en donde se degrada a blanco grisáceo hasta llegar a las infra-caudales. La hembra presenta una coloración verde oliva, en tonos grisáceos en la parte dorsal y más amarillento en la ventral. Ambos presentan patas anaranjadas.



Alimentación

Tityridae

Aves neotropicales conocidas como titiras, poseen un tamaño de pequeño a mediano, generalmente con cabeza grande, cola corta y plumajes de diversas coloraciones según la especie. Se alimentan principalmente de frutos e insectos pequeños. Construyen sus nidos con hojas y musgos en huecos de árboles; la hembra es quien incubaba, pero ambos padres alimentan y cuidan a los pichones. Habitan principalmente en claros y bordes de bosque.




Pachyramphus rufus - Foto: Luis Eduardo Urueña

Cabezón cinéreo

Cinereous Becard

Pachyramphus rufus



Autor de la ficha: Juan Manuel Currea.

Foto: Luis Eduardo Urueña

Etimología:

El género *Pachyramphus* deriva de las palabras griegas *pakhus* y *rhamphos* para referirse a pico grueso; el epíteto *Rufus* hace referencia al color rufo o ocre.

Descripción:

El macho es de color gris por encima, con la coronilla hasta la base del cuello negro; la frente, cuello y partes inferiores color blanco, cola y alas de color negro con márgenes grisáceos. La hembra es de color rufo por encima, con la coronilla más oscura, garganta blanca, lados de la cara y partes inferiores crema con tinte anaranjado en el pecho.

Aspectos ecológicos:

Se distribuye por debajo de los 1400 m s. n. m.; por lo general en áreas abiertas en diferentes tipos de hábitats. Puede verse en parejas o solitarios, moviéndose desde el sotobosque hasta el subdosel.

Usualmente silenciosos y poco activos, se alimentan de artrópodos y pequeños frutos, pudiéndose ver con frecuencia en cauchos atrapando insectos. Se ha reportado cazando insectos al vuelo, incluso de gran tamaño, como los grillos verdes, los cuales golpea contra las ramas hasta matarlos (Obs. N. Vega).



Alimentación

Tyrannidae


Conocidas como atrapamoscas, mosqueritos y tiranos, se encuentran entre las aves más numerosas y diversas. Son de tamaño pequeño a mediano, presentan una gran variedad de formas y proporciones corporales; la mayoría poseen plumajes con coloraciones opacas. Se alimentan principalmente de insectos que atrapan al vuelo, aunque algunas especies se alimentan también de frutos; presentan largas cerdas alrededor del pico para detectar sus presas.



Myiozetetes similis - Foto: Miguel Moreno Palacios



Mosquerito ocre Ochre-bellied Flycatcher *Mionectes oleagineus*



Autor de la ficha: Patricia Hurtado Vargas.

Foto: Jorge García Melo

Etimología:

El género deriva del griego *meionek-*tes que significa pequeño, y el epíteto viene del latín *oleagineus* que traduce coloreado de oliva; en conjunto su nombre significa ave pequeña de color oliva.

Descripción:

Esta ave presenta un pico delgado, la mandíbula superior es de color negro y la inferior es *beige* en la base y negra en la punta; la cabeza, el dorso y las escapulares son verde oliva, las demás plumas del ala presentan un borde ocre. El pecho y demás partes por debajo son de color ocre, la parte final de las rectrices son de color gris oscuro.

Aspectos ecológicos:

La especie se encuentra principalmente distribuida en tierras bajas, pudiendo llegar hasta los 1700 m s. n. m.; habita principalmente en el interior del bosques secos y húmedos de tierras bajas, algunas veces en bordes bosques, forrajeando en el follaje en el estrato bajo a medio, en busca de frutas e insectos. En la época reproductiva los machos suelen formar *leks*.




Alimentación

Picoplano azufrado

The yellow - olive flatbill

Tolmomyias sulphureus



Autor de la ficha: Yolanda Mosos Angarita.

Foto: Miguel Moreno Palacios

Etimología:

El nombre quiere decir atrapamoscas audaz, producto de las raíces griegas *tolmós* que significa audaz y *myias*, modificado de griego atrapamoscas. El epíteto *sulphureus* es referido a que es de color amarillento sulfuroso, derivado del latín *sulphureus* y *scens*.

Aspectos ecológicos:

Especie difícil de observar, de estratos altos, principalmente en el interior del bosque seco tropical al bosque húmedo. Se reconoce regularmente por su canto simple y enérgico; se alimenta de insectos que encuentra en la vegetación o que atrapa en el vuelo.



Descripción:

Ave relativamente pequeña; el pico es relativamente corto y plano, de color negro en la mandíbula superior y rosado de la mandíbula inferior. La cabeza es gris azulada, con una ceja baja y blancuzca, que parte de la base superior del pico; medialuna en forma de oreja verde oliva, contrastante hacia los auriculares.

Los ojos cafés son oscuros con finos anillos oculares de color amarillo blancuzco. El dorso es verde oliva, con alas negruzcas finamente bordeada de amarillo oliva, con dos barras alares contrastantes amarillo azufrado. La cola es relativamente larga en comparación con otros pequeños tiranidos.




Alimentación



Tiranuelo crestibarrado

Scalecrested Pygmy-tyrant

Lophotriccus pileatus



Autor de la ficha: Teresa Castiblanco Leal.
Foto: Jorge García Melo / Rossmayra Marulanda

Etimología:

Lophotriccus del griego *lophos*, que significa cresta y *triccus*, de atrapa-moscas. Del latín *pileatus*, que significa capucha.

Descripción:

Atrapamoscas pequeño (10 cm). Su cabeza se caracteriza por una cresta de plumas negras con bordes canela, pico negro corto con bigotes, ojo blancuzco, garganta blanco sucio, estriada de oliva, espalda amarillo oliva, vientre y dorso amarillo claro. Las alas y la cola son negras con bordes amarillo limón.

Aspectos ecológicos:

Se observa en diversas zonas del bosque como bordes y estructuras secundarias. Es insectívoro y solitario, aunque difícil de observar, se delata fácilmente por su canto constante y en chillido.




Alimentación

Espatulilla común

Common Tody - Flycatcher

Todirostrum cinereum



Autor de la ficha: José Sosa Salgado.

Foto: Rossmayra Marulanda

Etimología:

Su nombre *Todirostrum* deriva del latín *todus*, referente probablemente al tamaño pequeño y *rostrum* a cara o pico. *Cinereum* deriva del latín gris ceniza.

Descripción:

Ave pequeña con pico ancho y de color negro. La cabeza es negra desde la base superior del pico hacia atrás, influyendo la parte del ojo, el cual es contrastante por su color amarillo. La garganta es amarillo claro, extendiéndose hacia el pecho y el abdomen. Espalda gris verdoso, alas negro pálido con dos barras alares y márgenes de las plumas amarillas; cola negra, usualmente levantada.

Aspectos ecológicos:

Fácil de ver, revolotea y caza a media altura moviendo la cola de lado a lado como llamando la atención; frecuente áreas abiertas en jardines y cerca de las viviendas donde además construye sus nidos. En el municipio de Ibagué es frecuente todo el año, tanto en el área urbana como rural, anidando y reproduciéndose cerca de viviendas humanas. Su nido es una pequeña bolsa o mochila colgante (similar a las que construyen especies grandes como las oropéndolas), construida con fibras muy suaves y largas que extraen de calcetas de plátano secas suaves y diferentes fibras de pastos secos.



Preocupación menor




Alimentación



Tiranuelo cejiamarillo

Golden-Faced Tyrannulet

Zimmerius chrysops



Autor de la ficha: Gissela Sánchez Castiblanco.

Foto: Miguel Moreno Palacios

Etimología:

El género *Zimmerius* fue erigido en honor del ornitólogo americano John Todd Zimmer. La palabra *chrysops* viene del *khryseos* que significa dorado o de color oro, y *ôps* de cara, es decir, de cara dorada.

Descripción:

Atrapamoscas de 11 cm. Cabeza con coronilla de color verde oliva, ceja y frente amarilla, lista ocular delgada de color negro, ojos y pequeño pico negro. La garganta, pecho y abdomen son de color verde oliva. Las alas y la cola son negras con bordes amarillo oliva y las patas son negras.

Aspectos ecológicos:

Frecuenta el dosel y borde de bosque, incluso en hojas secas de los helechos arbustivos buscando insectos; se escucha frecuentemente con un silbido de lamento similar a un *fiuuuuuu*, durante casi todo el día. Es muy abundante en áreas de cafetal; principalmente solitario, aunque puede verse en parejas, o unirse a bandadas mixtas. Pasa usualmente desapercibido por su pequeño tamaño y que permanece principalmente en el estrato medio o dosel.




Alimentación

Mosquerito coronado

Yellow-Crowned Tyrannulet

Tyrannulus elatus



Autor de la ficha: Miguel Moreno Palacios.

Foto: Miguel Moreno Palacios.

Etimología:

Tyrannulus, diminutivo del latín *Tyrannus*, rey, tirano, haciendo referencia al comportamiento agresivo de las aves de este grupo. Del latín *elatus*, elevado, exaltado, erguido, aludiendo a su forma de posarse.

Aspectos ecológicos:

Atrapamoscas común en gran parte del país. Habita desde bosques húmedos a secos en tierras bajas, generalmente < 1500 m.

Difícil de ver, dado su tamaño y hábitos de posarse en perchas altas en la copa de los árboles. Sin embargo, es frecuentemente registrado por su canto distintivo, un silbido corto de dos sílabas que el ave puede repetir durante largo tiempo, incluso durante las horas del mediodía. Generalmente se observan aves solitarias o en parejas cantando, mientras forrajejan en búsqueda de insectos u otros artrópodos, pero es muy raro verlo haciendo parte de bandadas mixtas.

Descripción:

Atrapamoscas pequeño, de 10 cm y 7 g. Cabeza gris con coronilla amarilla semiculta, banda superciliar grisácea y línea ocular negruzca. La garganta es más clara, iris café claro y pico negro corto. Por encima es verde oliva con alas cafés y plumas secundarias bordeadas de amarillo. Tiene dos barras alares amarillo claro y las partes inferiores de color amarillo pálido, cola café, patas grises.


Las hembras son ligeramente más pequeñas y de color más pálido.



Alimentación



Greenish Elaenia *Myiopagis viridicata*



Autor de la ficha: Beatriz Méndez Cubillos.

Foto: Miguel Moreno Palacios

Etimología:

El género *Myiopagis* proviene de las raíces griegas, *muia* y *pagis*, referido a atrapamoscas. El epíteto *viridicata* proviene del latín *viridicatus* para hacer referencia al verde oliva ubicado dorsalmente.

Aspectos ecológicos:

Comúnmente solitario, raro y difícil de ver, en bosque seco y transición a húmedo en estratos medios a altos. Se alimenta principalmente en el follaje de insectos y, en menor medida, de frutos y semillas pequeñas.



Descripción:

Cabeza de color verde oliva con degradado grisáceo en los lados de la cara y parche oculto amarillo en coronilla; tiene una línea a través del ojo verde oliva oscuro no tan contrastante, bordeada por ancha superciliar clara; anillo ocular contrastante amarillo claro y oreja verde oliva oscura en auricular. La espalda es verde oliva, al igual que los flancos en pecho. Pecho y garganta amarillo oliva, más clara en esta última; este color se degrada a amarillo desde bajo pecho, pudiéndose ver estriar olivas. Las demás áreas por debajo amarillo, cola amarillo oliva, alas negruzcas con amplias márgenes amarillas contrastantes, con una pequeña franja más brillante en hombros.




Alimentación

Tiranuelo cabecigrís

Sooty-headed Tyrannulet

Phyllomyias griseiceps



Autor de la ficha: Jorge Arturo Romero Barrera.

Foto: Luis Eduardo Urueña

Etimología:

Su nombre viene del griego y del latino *phýllon* y *myias*, que significa atramoscas de las plantas. El epíteto *griseiceps* se origina del latín *griseus* y *ceps*, referente a que presenta la cabeza gris.

Aspectos ecológicos:

Esta especie usualmente pasa desapercibida por su pequeño tamaño y preferencia por la parte alta de los árboles; no obstante, su canto en trino es fácilmente distinguible durante el día. Algunos campesinos destruyen sus nidos porque creen que la especie dispersa semillas de plantas parásitas sobre árboles de interés como aguacates.



Descripción:

Posee un pico corto de color negro opaco, ojos de café oscuro, cabeza de color gris, garganta y cuello de tono blanco grisáceo, pecho amarillo limón, abdomen amarillo, alas grises con bordes manchados de color blanco, dorso de color verde pasto y rabadilla amarillo limón.



Preocupación menor




Insectívoro

Alimentación

Mosquerito murino

Mouse-coloured Tyrannulet

Phaeomyias murina



Autor de la ficha: Diego Carantón-Ayala.

Foto: Luis Eduardo Urueña

Etimología:

La primera parte del nombre proviene de la palabra griega *Phaiós*, que denota color parduzco y *myias*, que significa atrapamoscas, entendiéndose como atrapamoscas pardo. La segunda parte, *murina*, quiere decir color gris ratón, por el tono gris opaco que tiene la especie.

Aspectos ecológicos:

Es una especie común que prefiere los claros, zonas abiertas con rastrojo y los bordes de bosque, principalmente por debajo de los 1500 m. Se mueve en árboles y arbustos y captura insectos pequeños al vuelo o en el follaje. Es difícil de identificar por lo que pasa desapercibida o se confunde con otro atrapamoscas, para esto es de gran ayuda conocer su vocalización.

Descripción:

Es un atrapamoscas de aproximadamente 13 cm que se caracteriza por ser poco vistoso, presenta colores opacos y grises que dan origen a su nombre científico. Pico corto, oscuro con la mandíbula pálida. La coronilla, espalda y cola son de coloración oliva grisácea con apariencia destefiada, las alas ligeramente más oscuras presentan dos barras alares café claro.

Superciliar difuso blanquecino, pecho grisáceo que se torna amarillo pálido hacia el vientre.



Preocupación menor




Insectívoro

Alimentación

Atrapamoscas pirata

Piratic Flycatcher

Legatus leucophaius



Autor de la ficha: Jorge Arturo Romero Barrera.

Foto: Miguel Moreno Palacios

Etimología:

La palabra *Legatus* es una palabra latina que significa gobernador. El epíteto *leucophaius*, que deriva de las palabras griegas *leukós* y *phaiós*, refieren al gris blanquecino.

Descripción:

Posee un pico pequeño de color negro, con ojos café oscuro y la cabeza con la coronilla y mejillas negruzcas. Su garganta es de color blanco, el pecho y abdomen son de tonalidad amarillo verdoso con estrías difusas café parduzco. El dorso es de color verde oliva, con las alas y cola color café negruzco, con bordes blancuzcos en las alas.

Aspectos ecológicos:

Es una especie frecuente en áreas abiertas arboladas y bordes de bosque; usualmente en pareja, se escucha cantar durante casi todo el día. Consume tanto frutos como insectos, pudiéndose observar por varios días en el mismo territorio.




Alimentación



Sirirí rayado

Streaked Flycatcher

Myiodynastes maculatus



Autor de la ficha: Jovany Celemin.


Foto: José Sosa / Orlan Vargas

Etimología:

Su nombre tiene como significado señor de las moscas manchado; derivado del griego *muia*, mosca; *dinastes*, señor y *maculatus*, manchado.

Aspectos ecológicos:

Lo podemos ver en bosques húmedos, en bordes de bosque y bosques semidecíduos; algunas veces en parques arbolados en la ciudad. Particularmente solitario o a veces en pareja en las partes media y alta del bosque. Tiene una dieta variada que incluye desde artrópodos, lagartijas y pequeñas frutas. Suele pasar desapercibido, excepto cuando vocaliza. Principalmente residente, aunque algunas poblaciones son migratorias boreales, que tiene sus lugares de reproducción en Centroamérica.



Descripción:

Tyranoide tiene la corona rufa, presenta superciliares blanco amarillentos y una banda ocular negra y ancha con malaros oscuros; su pico es negro y la parte inferior es de color amarillo. Su espalda es de color marrón claro estriada de negro. Las alas son negruzcas con bordes rufos, al igual que la rabadilla y la cola. Por debajo es de color amarillo pálido con estrías negruzcas.



Preocupación menor




Insectívoro

Alimentación

Suelda crestinegra

Rusty margined flycatcher

Myiozetetes cayanensis



Autor de la ficha: Yolanda Mosos Angarita.
Foto: Rossmayra Marulanda / Miguel Moreno

Etimología:

El nombre *Myiozetetes* viene de las raíces griegas *myiā* y *zētēō*, refiriéndose a que busca moscas. El epíteto *cayanensis* se da en honor a la capital de la Guayana Francesa, Cayena.

Aspectos ecológicos:

Se alimenta de insectos los cuales atrapa en vuelo, constantemente regresando a la misma percha como la mayoría de los tiranidos. Es frecuente en áreas abiertas o bordes de bosque, hasta cerca de los 2000 m s. n. m.

Por lo general en parejas y muy vocal, emitiendo su canto común de una nota seguido de un trino o una nota de silbido en lamento.

Descripción:

Sus partes superiores son de color café oscuro, con la cabeza negra con dos franjas blancas al lado, que casi le dan la vuelta a la cabeza; en la coronilla tiene un parche oculto de color naranja. El pico es negro y corto; la garganta es blanca y su abdomen es de color amarillo. Las alas y cola son de color café, marginadas de rufo. Los bordes rufo y la espalda café permiten diferenciarlo del *M. similis*, el cual tiene espalda oliva y sin bordes.




Alimentación



Sirirí común

Tropical Kingbird

Tyrannus melancholicus



Autor de la ficha: Beatriz Méndez Cubillos.

Foto: Jorge García Melo

Etimología:

La palabra *Tyrannus* hace parte del latín modificado refiriéndose a tirano (familia Tyranidae); el epíteto *melancholicus* es una palabra latina que refiere a malhumorado.

Descripción:

La cabeza es gris claro más blanca en la garganta; pequeña máscara negruzca a través de ojo, parche naranja oculto en la coronilla, espalda oliva grisácea a oliva, las alas y cola son de un tono café negruzco, con márgenes blancuzcos contrastantes. Las partes bajas inferiores son amarillas con un tono oliva en el pecho. El pico y las patas son negras.

Aspectos ecológicos:

Se encuentra distribuido en casi en todo el territorio nacional, desde zonas bajas, donde es muy abundante, a zonas altas donde se vuelve escaso. Usualmente en parejas, perchado, cazando insectos al vuelo con su canto característico que pareciera decir *sirirí-sirirí*; de vez en cuando, se ha registrado consumiendo pequeños frutos. Habitante común de áreas urbanas, por efecto de la luz artificial, se puede observar perchado, cantando y cazando cerca de las farolas de la luz, desde altas horas de la mañana (3:00 a.m.).




Alimentación

Atrapamoscas apical

Apical Flycatcher

Myiarchus apicalis



Autor de la ficha: Jeniffer Andrea Domínguez Vargas.

Foto: Luis Eduardo Urueña

Etimología:

El género *Myiarchus* se deriva de las palabras *myîa* y *arkhós*, que en conjunto significan consecutivamente mosca y jefe gobernante de las moscas. El epíteto *apicalis* se refiere a la coloración en los ápices blancos de la cola, que lo diferencia de otras especies del género.

Aspectos ecológicos:

Habita en selvas y en bordes de montes claros, áreas de matorral, parches de monte y arbolado a orillas de arroyos. Son más numerosos en valles interandinos secos y áridos, menos en áreas moderadamente húmedas. Se alimenta de insectos, los cuales atrapa al volar desde una percha expuesta. Anida en cavidades, de tronco de árboles, aparentemente en áreas abiertas. Permanece solitario o en parejas entre la vegetación bien iluminada, en donde efectúa vuelos cortos en pro de una presa.

Descripción:

Su cabeza es de tonalidad gris (más oscura que la espalda), con una cresta dispersa; la garganta y el pecho de color gris sucio. Posee una cola distintiva, la cual es ligeramente redondeada con el margen externo de las rectrices externas y el ápice de todas, excepto el par central de tonalidad blanquecina (especialmente prominente desde debajo en campo).



Preocupación menor



Endémico




Insectívoro

Alimentación

Atrapamoscas cardenal

Vermilion flycatcher

Pyrocephalus rubinus



Autor de la ficha: Miguel Moreno Palacios.

Foto: Miguel Moreno

Etimología:

Pyrocephalus, con la cabeza de color rojo fuego. Se refiere al color rojo intenso en la coronilla de los machos. Proviene del griego *pyrós*, que significa fuego y *kephalé*, cabeza. El epíteto *rubinus*, del latín *rubeus*, de color rubí.

Aspectos ecológicos:

Especie común en zonas secas, rastrojos y áreas abiertas o arbolado disperso, al igual que dentro de la ciudad, en parques y jardines, hasta 2600 m. Confiada, es fácil de observar; usualmente en parejas, cantando desde las primeras horas de la mañana, aprovechando la luz de las farolas para la captura de insectos. Se percha en ramas expuestas o cables, a la espera de insectos y otros artrópodos pequeños. En despliegue de cortejo, el macho hace vuelos cortos hacia arriba y realiza una serie de notas rápidas a medida que desciende.



Descripción:

Ave pequeña con una leve cresta. El macho presenta la coronilla, garganta, pecho y partes inferiores color rojo. La nuca, manto, rabadilla, alas y cola son de color café negruzco. La línea ocular, auriculares y nuca se juntan formando una máscara negruzca.

El pico es negro, ancho en la base y patas negras. La hembra tiene la coronilla, nuca, manto, rabadilla, alas y cola color café grisáceo. La garganta y pecho blanco con estrías

cortas de color gris oscuro o rojizo. Las partes inferiores bajas están teñidas de color salmón rosáceo. Los machos inmaduros son similares a las hembras.




Alimentación

Atrapamoscas guardapuentes

The Black Phoebe

Sayornis nigricans



Autor de la ficha: Jorge Arturo Romero Barrera.

Foto: Jorge García Melo

Etimología:

El género *Sayornis* fue concebido en honor al naturalista Thomas Say; el epíteto *nigricans*, corresponde a una palabra latina que significa oscurecido.

Descripción:

Tiene los ojos café oscuro, el pico, la cabeza y, en general, las partes por encima de color negro, al igual que los flancos y el pecho. El borde de las plumas de las alas de color blanco, su abdomen es de color blanco y sus patas de color negro.

Aspectos ecológicos:

Esta especie se avista frecuentemente posado en puentes, sobre rocas o cualquier percha en el río, arroyo o cerca de él, usualmente cazando insectos al vuelo; rara vez se observa lejos del agua. Es común que el nido lo construya cerca al agua, en forma de tasa, hecha de barro y paja, ubicado en repisas rocosas, por encima de los dos metros.



Alimentación



Vireonidae

La mayoría son nativas del Neotrópico, y los restantes Neoártico; una gran parte de las especies son migratorias en los inviernos boreales. Poseen un tamaño de pequeño a medio, generalmente con plumajes de coloraciones opacas, cuentan con pico corto y terminado en punta ganchuda en algunos, que les facilita atrapar su alimento (insectos y otros artrópodos, algunas especies también lo hacen de frutos). Los machos, en la mayoría de las especies, son altamente cantores.




Vireo olivaceus - Foto: Miguel Moreno Palacios

Vireón cejirrufo

Scarlet-fronted parakeet

Cyclarhis gujanensis



Autor de la ficha: Yolanda Mosos Angarita.
Foto: Luis Eduardo Urueña / Miguel Moreno Palacios

Etimología:

La palabra *Cyclarhis* proviene de las raíces griegas *kýklos*, referido a círculo, y *rhínos* a nariz, haciendo referencia a las narinas redondeadas. El epíteto *gujanensis* hace referencia a las Guayanas.

Descripción:

La cabeza es grisácea con cejas amplias de color rufo rojiza, extendida desde la base superior del pico, adelgazándose hasta la nuca.

Los ojos son de color rojo, con pico rasado en la mandíbula superior y negruzco en el inferior. El resto de las partes superiores son de color verde oliva; garganta y pecho de color amarillo degradado a blanco en el abdomen.


Aspectos ecológicos:

Se alimenta principalmente de insectos, arañas y, ocasionalmente, de pequeños vertebrados como lagartijas. A menudo en parejas y solitarios, se camuflan principalmente en estratos superiores en los árboles, en bosques, bordes de bosque o áreas abiertas arboladas; usualmente difíciles de observar, se ubican gracias a que vocalizan constantemente.



Alimentación

Verdillo matorralero Scrub greenlet *Hylophilus flavipes*



Autor de la ficha: Jeniffer Andrea Domínguez Vargas.

Foto: Luis Eduardo Urueña

Etimología:

Del griego *Flavipes* *Hylophilus* significa amigo de los bosques, bosque, selva, espesura; *phílos* del griego, significa amigo; *philéo* del griego y del latín *flavus*, significa amarillo; *pes* es pies, patas.

Aspectos ecológicos:

Principalmente de estratos medios a altos, en árboles que pueden estar dispersos en áreas abiertas, como parques, jardines o bordes de bosque, en bosque secos a húmedos hasta los 1500 m s. n. m. Busca insectos entre el follaje, pero también se alimenta de bayas y semillas arilladas. Le gusta perchar en las ramas secas de los árboles, en donde pasa casi desapercibido por su coloración, a no ser por su canto constante como alegando con varias notas seguidas.



Descripción:

Es pequeño y rechoncho. El pico es más o menos grueso, de punta aguda, notoriamente rosado claro, y el iris es amarillo pálido. Los adultos son amarillo oliva por encima, incluidas los márgenes de las plumas de vuelo; en general, las alas y cola se tornan más oscuras teñidas de café oliva oscuro. La cara y la barbilla son café oliva y gradualmente pasan a amarillo oliva en el pecho y a amarillo bastante brillante en el resto de la región inferior. El pico y las patas son color carne.



Preocupación menor



Alimentación

Corvidae

Conocidos comúnmente como cuervos, arrendajos, cascanueces y carriquies. Están distribuidos prácticamente a nivel global, poseen un tamaño de mediano a grande, picos fuertes y rectos, cabeza grande, fuertes garras, plumajes con coloraciones blancas, negras, tonos amarillos, violetas y verdeazulados, no poseen dimorfismo sexual asociado al plumaje. Tiene hábitos omnívoros y, en algunas ocasiones, son carroñeros.




Cyanocorax yncas - Foto: Luis Eduardo Urueña

Urraca collareja

Black-collared Jay

Cyanolyca armillata



Autor de la ficha: Miguel Moreno Palacios.

Foto: Luis Eduardo Urueña

Etimología:

Cyanolyca, cuervo de color azul oscuro. Proviene del latín *cyanus*, azul oscuro y el griego *lýkos*, que significa lobo, aunque también hace referencia a algún tipo de cuervo. *Armillata*, del latín *armilla*, brazaletes, aludiendo al collar negro de la especie.

Aspectos ecológicos:

Habita bosques húmedos montañosos, por encima de 1500 m hasta el borde de páramo ~ 3200 m. Observada frecuentemente en bordes de bosque y bosques secundarios maduros. Se desconoce mucho sobre su dieta y ecología. En general se registra en parejas y pequeños grupos, en ocasiones bandadas mixtas con arrendajos, forrajeando en subdosel. Es una especie muy vocal, aparentemente con un amplio repertorio de notas cortas.



Descripción:

Cuervo de tamaño mediano de 30 cm y 100 g. Tiene un antifaz negro y ancho que se extiende hasta las auriculares. La coronilla y nuca son azul violeta, garganta azul brillante, bordeada por collar delgado negro, que se extiende desde los oídos. El resto del cuerpo es azul intenso. Las plumas de las alas y la cola son negruzcas por debajo. Los ojos son café; el pico y las patas son negras.



Preocupación menor



Endémico



Insectívoro



Frugívoro




Carnívoro

Alimentación

Carriquí pechiblanco

Black-chested Jay

Cyanocorax affinis



Autor de la ficha: Yair Guillermo Molina Martínez.

Foto: Luis Eduardo Urueña

Etimología:

La palabra *Cyanocorax* proviene del griego *kuanos* (azul oscuro) y *korax* (cuervo) para referirse a un ave similar a un cuervo azul oscuro; el epíteto *affinis* es una palabra latina usada al referirse a aliado o similar, en este contexto similar a un cuervo azul.

Aspectos ecológicos:

Especie típica de bosque seco tropical, aunque realice pequeñas migraciones a zonas más altas en bosques húmedos, hasta los 2400 m s. n. m. Particularmente del bosque y el borde, o en menor frecuencia en zonas abiertas arbolada, pudiéndose llegar a observar en relictos de bosque en la zona urbana. Usualmente forrajea en grupo, entre cinco y ocho individuos, principalmente en el dosel, por lo general se alimenta de insectos y otros artrópodos, pequeñas frutas y, ocasionalmente, pequeños mamíferos como lagartijas y ranas.



Descripción:

La cabeza y el babero es redondo de color negro; la ceja, bigotera y la mancha diagonal debajo del ojo son de color azul contrastante. La nuca y espalda son violeta grisáceo; las demás partes por encima son color azul oscuro, al igual que la cola, exceptuando el ápice de las plumas que es de color blanco. El resto de las partes por debajo es blanco crema; ojos amarillos, pico negro y relativamente grande con relación a un passeriforme.



Preocupación menor



Endémico



Insectívoro




Frugívoro



Carnívoro

Alimentación

Quinquina Green Jay *Cyanocorax yncas*



Autor de la ficha: Yair Guillermo Molina Martínez.

Foto: Luis Eduardo Urueña

Etimología:

La palabra *Cyanocorax* proviene del griego *kuanos* (azul oscuro) y *korax* (cuervo) para referirse a un ave similar a un cuervo azul oscuro; el epíteto *yncas* hace referencia al pueblo nativo inca.

Aspectos ecológicos:

Se distribuye en la cordillera de los Andes hasta los 3000 m s. n. m.; principalmente en bosques húmedos, más frecuentemente en alta montaña. Aunque se alimenta principalmente de frutas, es considerado un depredador activo del dosel, consumiendo desde insectos grandes hasta serpientes, lagartijas, huevos y pichones; en algunas regiones se conoce como robador de huevos de gallinas. Usualmente en grupos de tres a cinco individuos, con cría cooperativa, en donde los juveniles de la temporada reproductiva anterior contribuyen al cuidado de los polluelos de la temporada actual.



Descripción:

Tiene un antifaz y babero redondo negro; la frente con penacho pequeño, ceja pequeña y corta, y bigotera extendida casi hasta el ojo, todas de color azul contrastante. La coronilla y parte de la nuca de color blanco que se degrada a verde primavera, las demás partes por encima, incluyendo la cola, son del mismo verde. El pecho y demás partes por debajo son de color amarillo lima. Los ojos amarillos y pico negruzco.



Preocupación menor



Insectívoro



Frugívoro



Carnívoro

Alimentación

Troglodytidae

Familia distribuida globalmente, sin embargo, con el mayor número de especies en el continente americano; son conocidos comúnmente como matracas, saltaparedes, chochines y cucaracheros. Aves de tamaño pequeño, suelen tener plumajes con coloraciones opacas (grises, marrones, castaños), en algunos casos mezclados con parches blancos y negros, la mayoría tienen barras en sus alas o cola, las cuales son redondeadas. Su cola es corta y casi siempre la llevan levantada, poseen pico fino y puntiagudo propio de las aves insectívoras; se alimentan de insectos, larvas, orugas y pequeñas arañas. Son excelentes cantoras, muy notorias, que no pasan desapercibidas.




Campylorhynchus griseu- Foto: Jeyson Sanabria Mejía



Cucarachero común

House Wren

Troglodytes aedon



Autor de la ficha: Diba Andrade.

Foto: Luis Eduardo Urueña / Miguel Moreno Palacios

Etimología:

El nombre del género *Troglodytes* viene de la raíz griega *trōglodytēs* que significa que vive en cavernas; el epíteto *aedon* también proveniente de la raíz griega *Aēdon* para referirse a que canta como el ruiseñor.

Aspectos ecológicos:

Asociada siempre a las construcciones humanas, se distribuye virtualmente en casi todo el país; es común en áreas abiertas arboladas y con matorrales, en zonas de cultivo, parques y jardines, tanto en zonas rurales como urbanas. Esta especie se alimenta de insectos e invertebrados y aparentemente es monógamo y se aparea durante todo el año en muchas regiones, de ahí que casi siempre se observa en pareja. Al igual que el copetón (*Z. capensis*), esta especie es susceptible a parasitismo de nido por el Chamón (*Molothrus bonariensis*). Se ha reportado anidando en arbustos de limón (Obs. L. Devia).



Descripción:

El pico es negruzco en la mandíbula superior y rosado en el inferior; superciliar leve de color crema con un anillo ocular más claro contrastante. La parte dorsal de su cuerpo exhibe un color café, mientras la región ventral es más clara, de un color beige. En las alas y cola corta presenta un patrón de barras horizontales en café oscuro o negro.



Preocupación menor




Insectívoro

Alimentación

Cucarachero buchinegro

Black-bellied wren

Pheugopedius fasciatoventris



Autor de la ficha: Santiago Vargas Sánchez.

Foto: Miguel Moreno Palacios

Etimología:

Del latín *fascia* que significa bandas y *ventrís*, vientre.

Aspectos ecológicos:

Es común escuchar su canto melodioso en las mañanas, mantiene en parejas, en diferentes zonas como bordes de bosque, bambusales y marañes. Aunque no se aleja del bosque puede verse en la zona urbana, en especial en conjuntos con fuentes hídricas cercanas. Consume principalmente insectos y otros artrópodos; aunque usualmente de estratos bajos puede incursionar en el estrato medio o por debajo del dosel.



Descripción:

Cucarachero de 16 cm. La corona, nuca y espalda de color canela, ceja blanca, babero blanco inmaculado, pico negro, abdomen barrado negro y blanco. Las alas y cola barrada canela y negro, y patas grises.




Alimentación

Cucarachero bigotudo de montaña

Whiskered Wren

Pheugopedius mystacalis



Autor de la ficha: Diego Carantón-Ayála.

Foto: Miguel Moreno Palacios

Etimología:

El género de esta especie en terminología griega hace alusión a que se mueve por el campo, *pheúgo* significa huir, correr, y *pedión* se relaciona con campo o suelo; mientras que *mystacalis* se refiere a bigote, mostacho, por la línea blanca en forma de bigotera que resalta en la cara.

Aspectos ecológicos:

Esta especie se distribuye por encima de los 1500 m y prefiere ambientes de vegetación densa y enmarañada como los chuscales, donde encuentra su alimento y puede pasar desapercibido ante los depredadores. Consume insectos pequeños y otros invertebrados. Tiene un repertorio vocal amplio y bastante melódico, por lo cual es un gusto escucharlo, especialmente en las mañanas. Es común en el cañón del Combeima en Ibagué.

Descripción:

Es un cucarachero mediano de 16 cm, con manto, alas y rabadilla rufo castaño. La coronilla y nuca es gris, superciliar blanco marcado, mejillas negras con tintas blancas y una línea negra fuerte a los lados de la garganta en forma de bigotera. La garganta es blanquecina que se torna café claro en el pecho y hasta el vientre más oscuro. La cola es café rojiza con barras negras.



Preocupación menor




Endémico



Insectívoro

Alimentación

Cucarachero montes pechigris Gray-breasted Wood Wren *Henicorhina leucophrys*



Autor de la ficha: Diego Carantón-Ayála.

Foto: Jeyson Sanabria Mejía

Etimología:

El género proviene de las palabras griegas *hénikos* que significa único, singular; y *rhínos* que indica nariz, la forma del pico y narinas indican una nariz particular. El término griego *leucophrys* es compuesto de *leukós* que se relaciona con el color blanco y *ophrys* que indica ceja o frente, por lo tanto, resalta la característica de ceja blanca.



Aspectos ecológicos:

Prefiere estar en la vegetación densa del bosque y en rastrojos cerrados de zonas templadas y frías de Ibagué. Se caracteriza por moverse activamente en los arbustos en busca de pequeños insectos, además de emitir un melódico canto principalmente en las horas de la mañana. Es bastante territorial y cuando siente intrusos cerca responde con reclamos constantes y fuertes.

Descripción:

Es un ave pequeña, mide de 10 a 12 cm, la cola corta y de apariencia regordeta. El pico es delgado, ligeramente curvo; la coronilla es café oscuro, superciliar delgado blanco que se extiende hasta la nuca, bordeado de línea negra; las mejillas y el cuello está manchado de blanco y negro. La garganta y el pecho es de color gris claro; dorso café castaño, vientre y rabadilla café rojizo. Las alas y cola son castaño con líneas negras, y las patas son grises.




Alimentación

Cucarachero pechiblanco

White-breasted Wood Wren

Henicorhina leucosticta



Autor de la ficha: Diego Carantón-Ayála.

Foto: Carlos A. Guevara

Etimología:

El género proviene de las palabras griegas *hénikos* que significa único, singular; y *rhínos* que indica nariz, haciendo alusión a la forma de las narinas casi ocultas, "que posee una nariz particular". La especie *leucosticta* (palabra también griega) significa manchado de blanco.

Aspectos ecológicos:

Es difícil de observar debido a sus hábitos furtivos en el sotobosque de zonas cálidas y húmedas, principalmente por debajo de los 1000 metros de elevación. Como otros cucaracheros, tiene un canto elaborado y melódico que facilitan confirmar su presencia en los sectores donde está presente. Es bastante activo y se desplaza por la vegetación densa, donde busca insectos pequeños que constituyen su dieta.



Descripción:

Es un ave pequeña, mide de 10 a 12 cm, la cola corta y de apariencia regordeta. El pico es delgado, ligeramente curvo; la coronilla es negruzca; superciliar delgado, blanco, que se extiende hasta la nuca bordeado de línea negra, mejillas y cuello manchado de blanco y negro. La garganta y el pecho de color blanco, dorso café castaño. Las alas y cola son color castaño con líneas negras.



Preocupación menor



Alimentación

Turdidae

Familia de aves conocidas como mirlas, zorzales y tordos; se encuentran globalmente distribuidos. Poseen un tamaño mediano, patas largas, cola mediana y cuadrada, alas largas y puntiagudas, pico recto y ojos grandes, suelen tener plumajes con coloraciones opacas (marrones, grisáceas y negras). Se alimentan principalmente de frutos, insectos, larvas y lombrices que escarban en el suelo. Se caracterizan por tener cantos complejos y melodiosos.




Turdus fuscater - Foto: Jorge García Melo



Mirila pechipálida

Pale-breasted Thrush

Turdus leucomelas



Autor de la ficha: Yair Guillermo Molina Martínez.

Foto: Luis Eduardo Urueña

Etimología:

El género *Turdus* es una palabra latina que hace referencia a Mirla; el epíteto *leucomelas* se origina de las raíces griegas *leukos* y *melas*, que en conjunto significan blanco oscuro.

Descripción:

La cabeza es gris azulado oscuro, con garganta blanca finamente estriada de café; ojos de color marrón rojizo y pico negro grisáceo. Por encima, las otras partes son marrón y, por debajo, con flancos café oliva que se degrada a blanco en la parte central desde el pecho bajo hasta las infracaudales. Por debajo del ala, en las coberturas alares, las plumas son de color rufo canela.

Aspectos ecológicos:

Se distribuye por todo el departamento hasta los 1800 m s. n. m.; principalmente donde abunde vegetación arbolada; en bordes de bosque, matorrales arbolados, bosques riparios, hasta parques en zonas urbanas. Son activas cantadoras desde muy temprano en la mañana y regularmente durante el día, sobre todo en época reproductiva. Se alimenta de frutos pequeños, insectos y otros macroinvertebrados, incluso pequeños vertebrados, llegando a ser predatoria de nido. Sus nidos son tasas fabricadas con paja, raíces, musgo y barro. Presenta una gran variedad de repertorios, con cantos más graves, cortos y con abundancia de trinos, a diferencia de la *Turdus ignobilis*.



Alimentación

Fringillidae

Aves conocidas como jilgueros y eufonias; generalmente de talla pequeña, cabeza redondeada, pico corto, grueso y cónico, cola cuadrada, en la mayoría de las especies. Poseen variadas coloraciones en el plumaje dentro de los que resaltan los marrones, castaños, amarillos, azulados, grises y negros. Se alimentan de granos y pequeños insectos.




Spinus psaltria - Foto: Gissela Sánchez

Eufonia del Magdalena

Velvet-Fronted euphonia

Euphonia concinna



Autor de la ficha: Carlos Alfonso Guevara Colmenares.

Foto: Nicolás Vargas

Etimología:

Su nombre significa canto bello y elegante. *Euphonia*, palabra proveniente del griego que significa de canto bello y *concinna* del latín *concinus*, que representa elegante.

Aspectos ecológicos:

Especie endémica del centro de Colombia, en el alto valle del Magdalena, desde el norte del Tolima, Huila y Cundinamarca.

Habita el bosque seco tropical o subtropicales, incluso se observa con frecuencia en la ciudad de Ibagué. Se percha en la parte media-alta de los árboles, alimentándose de frutos. En algunas ocasiones puede observarse en comederos de banano (Los Alpes spa ambiental).



Descripción:

Se distingue de las otras euphonias por su frente de color negro con parche anterior de la coronilla de color amarillo; los lados de su cabeza, garganta y pecho son de color negro-azul acero con espalda lustre purpúreo, iris negro y pico negro metalizado; el vientre y el resto de las partes inferiores son de color amarillo teñido de ocráceo y cola negra. Las hembras son de color oliváceo en la parte superior y un poco más opaca de la nuca hacia abajo, presenta un parche amarillo en parte de la frente y el resto de las partes inferiores son amarillo mate.



Preocupación menor



Endémico



Insectívoro




Frugívoro

Alimentación

Eufonia gorgiamarilla

Thick-billed Euphonia

Euphonia laniirostris



Autor de la ficha: Jorge Arturo Romero Barrera.

Foto: Jorge García Melo / Gissela Sánchez

Etimología:

Su nombre *Euphonia* proviene del griego *eu* y *phōné*, que significa de canto hermoso. El epíteto *laniirostris* proviene de las raíces latinas, *lanius* y *rostris* refiriéndose a aves con pico similar a los lanius.

Aspectos ecológicos:

Se escucha cantar frecuentemente, con un silbido simple o un conjunto de notas y trinos complejos que resultan en hermosas melodías; comúnmente en bordes de bosque, bosques secundarios, jardines y áreas abiertas arboladas. Se observa comúnmente consumiendo frutos de guayabo, guineo maduro, siendo visitante frecuente en comederos de banano.

Descripción:

Posee un pico pequeño de color negro y ojos de tonalidad café oscuro; en su cabeza la coronilla es de color amarillo y el restante de color azul oscuro lustroso; su garganta es de color amarillo; su dorso y alas son de color azul oscuro lustroso, su pecho y abdomen son de color amarillo; y las plumas de la cola son, por encima, de color azul lustroso, con las plumas centrales por debajo de color blanco. La hembra es verde oliva por encima sin parche amarillo en la coronilla, con alas negruzcas con bordes amarillos; por debajo es completamente amarilla. El macho juvenil es similar a la hembra, pero con parche pronunciado amarillento.



Preocupación menor



Insectívoro



Frugívoro


Alimentación



Clorofonia verdeazul

Blue-Naped Chlorophonia

Chlorophonia cyanea



Autor de la ficha: Rossmayra Marulanda Bejarano.

Foto: Luis Eduardo Uruña

Etimología:


El género *Chlorophonia* se deriva de la palabra *Euphonia*, refiriéndose al género y de la raíz griega *khlōros*, de color verde. El epíteto *cyanea*, que deriva del griego *kuaneos*, hace referencia al color azul marino.

Descripción:

Es un ave robusta de cuello corto. El pico es corto y ancho, iris negro, anillo ocular azul, cabeza y garganta verde encendido, pecho y partes inferiores amarillo verdoso, manto y nuca azul brillante y alas verdes. Las hembras son más opacas que los machos, con las partes inferiores más verdosas y el manto menos azul.

Aspectos ecológicos:

Es un ave poco común, se distribuye de los 1000 a los 2100 m.s.n.m. Está asociada a bosques húmedos, aunque también puede encontrarse en jardines rurales y plantaciones; se alimenta principalmente de frutos, aunque en algunas ocasiones también lo hace de insectos. Son poco activas y se encuentran normalmente en las copas de los árboles.




Alimentación

Clorofonia ferruginea

Chestnut- breasted

Chlorophonia

Chlorophonia pyrrhophrys



Autor de la ficha: Rossmayra Marulanda Bejarano.

Foto: Luis Eduardo Urueña

Etimología:

El epíteto *pyrrhophrys* proviene de las raíces griegas *pyrrhós* y *ophrus*, que significan color de llama o rojo y ceja, respectivamente. En términos generales, ave similar a la eufonia de color verde con una ceja roja, tal y como se ve en la hembra.

Aspectos ecológicos:

Usualmente encontrado en parejas o grupos muy pequeños, principalmente en el dosel de la selva húmeda; en algunas ocasiones puede observarse en pastizales con árboles aislados. Se distribuye desde los 1400 hasta los 2700 m s. n. m., su alimentación se basa principalmente en frutas como bayas, aunque ocasionalmente también se alimenta de algunos pequeños insectos.



Descripción:

Es un ave robusta, de pico corto, iris café oscuro, laterales de la cabeza, garganta y parte superior del pecho verde. La coronilla y nuca son azules, bordeados de negro, a excepción de la parte trasera; las partes inferiores son amarillas y una lista en la mitad del vientre y pecho, de color castaño. La hembra tiene el vientre amarillo verdoso y una ceja vinotinta, extendida hasta la frente.



Preocupación menor



Insectívoro



Frugívoro

Alimentación




Rhodinocichlidae

Familia de aves compuesta por una sola especie (monoespecífica), en la cual podemos encontrar la enigmática especie neotropical *Rhodinocichla rosea*, también conocida como Tángara Rosada, ya que, según estudios filogenéticos, esta ave es la única asociada, aun viva, a un linaje antiguo (refiriéndose a la época del Eoceno: 34-56 millones de años o al Oligoceno: 23-34 millones de años), aislada así de la familia Thraupidae y Emberizidae, en las cuales anteriormente fue incluida por su afinidad con las mismas.



Rhodinocichla rosea - hembra - Foto: Jorge E. García

Rosita canora - Tángara rosada Rosy-thrush Tanager *Rhodinocichla rosea*



Autor de la ficha: Juan Felipe del Castillo Téllez.

Foto: Carlos A. Guevara / Jorge E. García Melo

Etimología:

La palabra *Rhodinocichla* proviene de las raíces griegas *rhódinos* y *kíkhlos*, referido a mirlo rosa. El epíteto *rosea* deriva del latín *roseus*, también significa de color rosa.

Aspectos ecológicos:

La especie vocaliza en gran parte del día, pero es difícil de observar ya que se mueven muy rápido entre la vegetación. Habita los matorrales de sotobosque, bordes de bosque húmedos, premontanos, muy bien adaptada al cultivo de café, principalmente alto o con sombrío. Bastante territorial, se observa en pareja o solitario dependiendo de la época. Forrajea en solitario, alimentándose de semillas, orugas, escarabajos y, a veces, de ranas.



Descripción:

Tiene una coronilla y lados de la cabeza y, en general, las partes superiores de color negro pizarra, con una lista superciliar rosa más ancha en la región supraloreal y más delgada detrás del ojo, que es de color blanco. El iris es de color café rojizo, el pico es puntiagudo, negro y largo. La garganta y el resto de sus partes inferiores son de color rosa brillante. Los lados y flancos son negro pizarra. Presenta dimorfismo sexual, en donde la hembra es similar al macho, pero el color rosa se cambia por el canela.



Preocupación menor



Insectívoro



Frugívoro

Alimentación



Passerellidae

Fue separada recientemente de la familia Emberezidae; son llamadas los gorriones del nuevo mundo. Sus especies se distribuyen por toda América, usualmente asociadas a áreas abiertas como pastizales, matorrales y zonas de cultivo. Son aves pequeñas, algo rechonchas, de picos cónicos grises o marrones; la gran mayoría presentan patrones distintivos en la cabeza, como cejas, listas y bigoterías. Se alimentan principalmente de semillas de pastos, pequeñas frutas, insectos y otros macroinvertebrados que encuentran preferiblemente en el suelo.




Chlorospingus flavopectus - Foto: Jorge García Melo

Pinzón piquinaranja

Orange - Billed Sparrow

Arremon aurantirostris



Autor de la ficha: José Sosa Salgado.

Foto: Rossmayra Marulanda Bejarano

Etimología:

Su nombre *Arremon* deriva de la raíz griega *arrhemon* que significa silencioso. La palabra *aurantiirrostris* deriva de las raíces latinas *aurantius* y *rostris* que significan pico de color naranja.

Aspectos ecológicos:

Este pinzón es frecuente en el municipio de Ibagué, desde zonas bajas hasta los 1500, aproximadamente. Típicamente del bosque, sobre todo en zonas húmedas o corredores biológicos y conectores entre nacimientos de invierno, en parejas o grupos de tres individuos, comen en el suelo y recogen semillas y frutillos caídos, también comen pequeños insectos. En algunas localidades puede salir en las zonas abiertas, en el césped y jardines, llegando inclusive a comederos artificiales con banano; igualmente se ha reportado el consumo de maíz y alpiste (Obs. T. Castiblanco).




Descripción:

El pico es de color naranja intenso, grueso, corto y fuerte, contrastante en el resto del cuerpo. La cabeza es blanca, pequeña, con tres listas negras desde la nuca hacia la base superior del pico, dos laterales por encima del ojo y la otra a lo largo de la cabeza, por la zona central de la coronilla. Tiene un collar medio negro que divide la garganta blanca del pecho y el abdomen es blanco grisáceo. La espalda, alas y cola son verde oliva. Las patas son color rosado.



Alimentación

Rufous-collared Sparrow *Zonotrichia capensis*



Autor de la ficha: Patricia Hurtado Vargas.

Foto: Arturo Romero

Etimología:

Su nombre *Zonotrichia* deriva de las raíces griegas *zōnē* (collar) y *thrix* (pluma). Su epíteto *capensis* hace referencia al cabo de buena esperanza en Suráfrica.

Aspectos ecológicos:

De amplia distribución, desde los 800 hasta los 3700 m s. n. m. Común en áreas abiertas, tanto urbanas y rurales, desde parques, jardines, hasta áreas de crecimiento secundario con matorrales. Se alimentan de semillas de gramíneas y otras hierbas, granos caídos y pequeños insectos. La especie es parasitada frecuentemente por el chamón común, observándose a crías del chamón siendo alimentadas por padres copetones, más pequeños que sus supuestos hijos.



Descripción:

El macho tiene la cabeza de color gris con el mentón blanco; en la coronilla tiene una pequeña cresta, pineal lateral, ocular y malar de color negro; la nuca y parte lateral de cuello es de color rufo. La garganta es de color blanco y tiene dos manchas laterales de color negro; el dorso, alas y cola es color café, en las alas presenta un patrón estriado con color negro; y el pecho y vientre es gris-pardo, siendo más café hacia los flancos. La hembra es muy similar al macho, pero las listas de su cabeza son más difusas y no tiene coloración rufa en la nuca, aunque sí presenta este color más opaco hacia los lados del cuello y en el pecho tiene pequeñas manchas negras.



Insectívoro



Granívoro




Frugívoro

Alimentación

Gorrión montés de anteojos

Yellow-headed Brush-Finch

Atlapetes flaviceps



Autor de la ficha: Yair Guillermo Molina Martínez.

Foto: Carlos A. Guevara

Etimología:

El género *Atlapetes* se deriva de las palabras griegas *Atlas* (rey Titán que se convirtió en una montaña) y *petēs* (aviador) para referirse al pájaro de *Atlas*. El epíteto *flaviceps* se origina de las palabras *flavus* (amarillo) y *ceps* (cabeza) para referirse a que tiene cabeza amarilla.

Descripción:

En general de color amarillo brillante con la corona, área loreal, auriculares y nuca teñida levemente de amarillo oliva, al igual que los flancos que se extienden más hacia la rabadilla. La espalda, alas y cola de amarillo oliva oscuro; el anillo ocular amarillo brillante, algo contrastante; el pico gris negruzco.

Aspectos ecológicos:

Distribuido generalmente entre los 1500 a 2200 m s. n. m.; habita principalmente áreas abiertas asociadas al bosque o muy cercanas al mismo, en bordes de bosque, matorrales, chuscales, claros naturales, incluso, matorrales con plantas de moras dispersas. Usualmente muy activo, forrajeando en el follaje, principalmente insectos y pequeños frutos. Por lo general en parejas, con su canto en un trino largo; acompaña bandadas mixtas con tángaras y tyránidos principalmente. Se sabe que anida en claros en el interior de bosques, aparentemente a baja altura y rodeado de vegetación en regeneración.



Vulnerable



Endémico



Insectívoro



Granívoro



Frugívoro

Alimentación



Icteridae

Esta familia incluye a las aves tropicales conocidas como toches, turpiales, caciques y oropéndolas; son de tamaño mediano a grande, presentan picos largos, cónicos y agudos, la coloración de sus plumajes es usualmente negro mezclado con tonos amarillentos, rojizos y anaranjados.

Habitan principalmente en áreas abiertas con árboles dispersos. Algunos miembros de esta familia construyen sus nidos en forma de bolsa o mochila, colgados de las ramas de los árboles. Los caciques y oropéndolas tienen complejas y extravagantes vocalizaciones, mientras que los toches y turpiales tienen melódicos cantos.




Chrysomus icterocephalus - Foto: Jorge García Melo

Oropéndola crestada

Crested Oropendola

Psarocolius decumanus



Autor de la ficha: Jorge Arturo Romero Barrera.

Foto: Jorge García Melo

Etimología:

Su nombre viene del griego *psar* y *ko-loiós* que significa cuervo estornino. El epíteto *decumanus* se origina del latín *decimus* referente a un legionario de la décima legión, por tener su pico en forma de espada.

Descripción:

Esta especie posee un pico de color blanco y grande, con ojos azules; con el cuello, las alas y el pecho de color negro lustroso. Las plumas de la parte inferior de la cola poseen un color amarillo, contrastante con las de encima, la rabadilla y las infracaudales de color café castaño.

Aspectos ecológicos:

En general es escaso en el municipio de Ibagué, no obstante, se ha observado con cierta frecuencia en el cañón del río Cocora, llegando con migraciones altitudinales a la reserva Paraíso del Cocora. Con una dieta variada, se ha observado consumiendo frutas, en particular de banano; también insectos y pequeños vertebrados. Se ha observado en bordes de bosques, bosques secundarios, en áreas abiertas o con sembradíos de aguacate; desplazándose en bandadas mixtas con *Cyanocorax affinis*, en su mayoría en el dosel arbóreo.



Preocupación menor



Insectívoro



Frugívoro




Carnívoro

Alimentación

Arrendajo de montaña

Southern Mountain Cacique

Cacicus chrysonotus



Autor de la ficha: Rossmayra Marulanda Bejarano.

Foto: Luis Eduardo Urueña

Etimología:

El nombre *Cacicus* es derivado de la lengua taíno de las Antillas, y hacía referencia a la autoridad de una comunidad. El epíteto *chrysonotus* es de origen griego, y significa “de espalda dorada”.

Descripción:

El pico es de color crema y ojos azul claro; en general el plumaje es negro, a excepción de la espalda baja, rabadilla y hombros, los cuales son amarillo encendido.

Aspectos ecológicos:

Habita en selvas húmedas o muy húmedas de tierras altas, selva de alta montaña, desde los 1700 hasta los 3200 m s. n. m.; suele encontrarse solitario o en bandadas mixtas, se alimenta principalmente de insectos, y es normalmente ruidoso al forrajear. Localmente raro, por lo general, pasa desapercibido a no ser por su canto. Se mueve en estratos medios a alto, en el interior o en el borde del bosque.



Insectívoro



Frugívoro



Carnívoro

Alimentación

Parulidae


Los miembros de esta familia son conocidos como reinitas, arañeros, parulas y mascaritas; son aves con cuerpos pequeños, picos finos y puntiagudos propios de aves insectívoras (insectos pequeños y otros invertebrados), principalmente en el follaje, buscando por encima y debajo de las hojas. En general poseen plumajes con tonos amarillos encendidos, marrones, grises, blancos o con negros mezclado; sobre todo con patrones distintivos en la cabeza, espalda y alas. Ocupan gran variedad de hábitats, desde bosques fríos y templados hasta selvas tropicales.



Myioborus ornatus - Foto: Arturo Romero



Reinita guarda ribera Buff-rumped Warbler *Myiothlypis fulvicauda*



Autor de la ficha: Juan Manuel Currea.

Foto: Teresa Castiblanco

Etimología:

La palabra *Myiothlypis* deriva del griego *muia* y *thlypis* para referirse inversamente a reinita que vuela; el epíteto *fulvicauda* se origina de las palabras latinas *fulvus* y *cauda* para denominar cola de color leonado.



Descripción:

En general, por encima es verde oliva, con una lista superciliar de color crema. Ventralmente es principalmente de color amarillento, con flancos más oscuros; cola con banda terminal verde oliva oscuro, con el resto hasta las supracaudales y rabadilla de color amarillo. El pico es negro y pequeño, y las patas amarillentas.

Aspectos ecológicos:

Distribuida por encima hasta los 1300 m s. n. m., usualmente asociada a afluentes de agua corriente, desde urbanos, intervenidos a interior de bosques conservados. Se mantiene usualmente en pareja durante todo el año, río arriba y abajo, moviéndose casi a ras del suelo, dando pequeños vuelos y posándose principalmente en el suelo en el área de la vegetación raparúa y el borde del afluente, por lo general con un fuerte canto. Cuando se posa mueve su cola de izquierda a derecha; se alimenta de pequeños insectos y otros invertebrados. Construye nidos en barrancos cerca al agua.



Preocupación menor




Insectívoro

Alimentación

Arañero cabecirrufo

Rufous-capped Warbler

Basileuterus rufifrons



Autor de la ficha: Jorge Arturo Romero Barrera.

Foto: Jorge García Melo

Etimología:

El género *Basileuterus* deriva del griego *Basileuterus*, refiriéndose a pájaro real. El epíteto *rufifrons* proviene del latín *rufus* y *frons* que significa que tiene la frente rufa.

Aspectos ecológicos:

Típicamente se observa en los bordes de bosque, desde el sotobosque hasta el dosel; forrajea activamente por encima y por debajo de las hojas en busca de pequeños insectos y arácnidos. Usualmente en parejas, por lo general con un canto poco conspicuo.

Descripción:

Sus ojos son café oscuro, el pico es negro, la coronilla y mejillas de color rufo, con una ceja blanca gruesa extendida desde el pico. El pecho, abdomen y garganta son de color amarillo, con la parte dorsal y alas coloreadas de verde oliva. Las patas son de color salmón rosáceo.



Preocupación menor



Alimentación



Cardinalidae

Familia de aves conocidas como cardenales, pirangas y piquigordos; presentan cuerpos de tamaño pequeño a mediano, pico grande y cónico, colas relativamente cortas, cabeza grande, con plumajes usualmente de colores vivos como amarillo, rojo, naranja, blanco o azul. Muestran dimorfismo sexual en la mayoría de las especies. Se distribuyen en bosques lluviosos, bosques altoandinos, sabanas, matorrales, entre otros. Se alimentan principalmente de semillas y frutos pequeños.




Piranga rubra - Foto: Jorge García Melo

Habia copetona

Crested Ant-tanager

Habia cristata



Autor de la ficha: Santiago Vargas Sánchez.
Foto: Luis Eduardo Urueña / Santiago Vargas

Etimología:

Habia es el término usado para referirse a pinzones y tangaras en lengua guaraní, y *cristata* del latín *cristatus* que significa cresta o penacho.

Descripción:

Ave de 17 cm. La cabeza es de color rojo escarlata brillante, con una cresta del mismo color mucho más alta y voluminosa en el macho. El pico es negro y ojos café oscuro. El pecho y espalda rojo escarlata matizado con gris, y el vientre rojo grisáceo.

Aspectos ecológicos:

Es un ave que permanece en grupos entre tres a cinco individuos, prefiere el sotobosque denso cerca a ríachuelos, se desplaza con rapidez entre las ramas, usualmente cantando. Se alimenta principalmente de insectos, pero también come frutos como el bencenuco, café y ortiga. Se observa en bandada mixtas con especies como el *Ramphocelus dimidiatus*. Se registra en varios afluentes del municipio de Ibagué con abundante vegetación riparia, por encima de los 1300 m. Puede llegar a cebaderos artificiales con sus crías a comer banano en tiempo de reproducción.



LC

Preocupación menor

E

Endémico



Insectívoro




Frugívoro

Alimentación



Pico grueso negrizul Blue - black grosbeak *Cyanoloxia cyanooides*



Autor de la ficha: Yolanda Mosos Angarita.

Foto: José Sosa / Nicolás Vargas

Etimología:

El género *Cyanoloxia* se deriva de la palabra griega *Kuanos* que significa azul oscuro, y *Loxia* refiriéndose al género de las aves piquitueras que poseen picos gruesos. El epíteto *cyanooides* se deriva del latín *cyanus* referido al color azul marino y *eidês* del griego que significa parecido, es decir, parecido al azul marino.

Descripción:

Todo el plumaje es de color azul rey, con pico corto y grueso, de color negro; superciliar brillante, al igual que parche en el hombro. Sus plumas de vuelo y cola son de color negro; patas grisáceas oscuras. La hembra es similar al macho, pero de color chocolate pálido, siendo la garganta más pálida.



Aspectos ecológicos:

Habita en bosques húmedos y secos, y bordes de bosques. Usualmente en parejas, forrajeando frutas y semillas y, ocasionalmente, insectos.



Alimentación

Thraupidae

Aves conocidas como tángaras, mieleros y semilleros; los miembros de esta familia habitan en zonas intertropicales. Poseen un cuerpo de talla pequeña, pico corto y cónico, alas puntiagudas, cabeza pequeña y plumajes con colores llamativos. Se alimentan básicamente de pequeñas frutas e insectos. Ponen huevos de colores verdosos o azul pálido con pintas negras; cantos suaves y largos, altamente complejos que, en la mayoría de los casos, son difíciles de identificar.




Hemithraupis guira - Foto: Jorge García Melo

Tángara peluda

Plushcap

Catamblyrhynchus diadema



Autor de la ficha: Rossmayra Marulanda Bejarano.

Foto: Luis Eduardo Urueña

Etimología:

La palabra *Catamblyrhynchus* se origina de las raíces griegas *katamblyoo* que significa despuntar y *rhunkhos*, pico; el epíteto *diadema* es una palabra griega que hace referencia a tocado real. Es decir, ave de pico rojo con un tocado real.

Descripción:

Los ojos son café oscuro, pico y patas de color negro; frente y parte anterior de la corona amarillo intenso, parte posterior de la corona y nuca, negras. El dorsal, alas y cola, gris oscuro, lados de la cabeza, vientre y rabadilla color rufo.

Aspectos ecológicos:

Se alimenta de pequeños insectos y semillas como la del bambú; especie poco común, pero puede encontrarse asociado a chuscales, bosques montanos y comúnmente siguiendo bandadas mixtas. Se distribuye de zonas medias a altas, desde los 2100 hasta los 3300 m s. n. m.



Insectívoro




Frugívoro

Alimentación

Mielero verde

Green Honeycreeper

Chlorophanes spiza



Autor de la ficha: Nicolás Vargas Sánchez.

Foto: Nicolás Vargas Sánchez

Etimología:

Del latín *Chloro* que significa verde/ amarilloso verdoso y el griego *Phanes* que representa lo brillante y demostrativo.

Aspectos ecológicos:

Se ven en parejas y frecuentan diversas zonas desde el dosel florecido en el bosque, hasta áreas abiertas como jardines. Llega regularmente a cebaderos e integra bandadas mixtas. Come diversos alimentos como néctar, frutos, semillas e insectos.



Es una tångara de 14 cm aproximadamente. Con diferencia de colores entre macho y hembra (dimorfismo sexual). El macho tiene la cabeza con color negro, excepto la nuca y garganta, las cuales son azul aguamarino al igual que el resto de su cuerpo. Los ojos rojos, pico amarillo en la mandíbula inferior y negro en la superior. Las alas con plumas primarias y secundarias negras y coberteras azules; cola con plumas azules con raquis negro. La hembra es de color verde amarilloso, un poco más amarillo en garganta, pecho y abdomen. Las alas primarias y cola con plumas negras y verdes; las patas son grises.



Preocupación menor



Insectívoro




Frugívoro

Alimentación

Canario común

Saffron Finch

Sicalis flaveola



Autor de la ficha: Yair Guillermo Molina Martínez.

Foto: Jorge García Melo

Etimología:

El género *Sicalis* se deriva de la palabra griega *sikalis* para referirse, al parecer, a pájaro espinudo. El epíteto *flaveola* se origina como diminutivo de la palabra latina *flavus* para denotar que es de color amarillo.

Aspectos ecológicos:

Ampliamente distribuido por debajo de los 2200 m s. n. m.; principalmente en áreas abiertas desde pastizales a zonas urbanas. Usualmente en parejas o bandadas de forrajeo monoespecíficas. El macho, por lo general, despliega numerosas variaciones de canto, durante todo el día, incluso se ha encontrado cantando desde muy altas horas de la mañana, cerca de lámparas de luz. Aunque se alimenta de semillas, principalmente de gramíneas, también puede consumir pequeños insectos. Al mediodía y al anochecer se han encontrado grandes agrupaciones de varios individuos, en el interior de árboles como el pera de Malaca, cantando intensamente.



Descripción:

El macho, en general, es de color amarillo brillante con la corona, frente y garganta con un tono amarillo anaranjado, más contrastante en la coronilla; nuca y espalda de color amarillo oliva, las alas y cola negras, marginadas de amarillo oliva. La hembra es gris oliva, con la espalda amarilla oliva estriada de negruzco, alas y cola negruzcas con bordes amarillo oliva, más oscuros que en el macho. El collar, nuca y babero amarillo, al igual que las coberteras infracaudales. El vientre presenta leves estrías pardas. Tanto hembra como el macho tienen la mandíbula superior negruzca e inferior amarillenta y patas rosadas.



Preocupación menor



Granivoro




Frugívoro

Alimentación

Picaflor lustroso

White-sided flowerpiercer

Diglossa albilatera



Autor de la ficha: Juan Felipe del Castillo Téllez.

Foto: Miguel Moreno Palacios

Etimología:

El nombre *diglossa* se deriva del griego *di* y *glôssa* que significa a dos lenguas; y *albilatera* se deriva del latín *albus* y *latus*, refiriéndose a que presenta costados blancos.

Descripción:

Su cabeza y demás partes del cuerpo son de color gris azul pizarra, con mechones blancos contrastantes en los flancos. El pico relativamente delgado con la punta en forma de gancho. La hembra es de color marrón oliva oscuro por encima y marrón por debajo; al igual que en el macho, presenta mechones laterales, pero más reducidos.

Aspectos ecológicos:

Este picaflor se distribuye desde los 1800 hasta los 2800 m s. n. m., principalmente en bordes de bosque, en parejas y, algunas veces, en bandadas mixtas. Se alimenta de semillas, frutos, insectos y néctar.

Este último aparentemente lo roba, perforando la flor lateralmente, evitando la polinización, no obstante se ha encontrado que pueden polinizar ciertas especies nativas.



Preocupación menor



Insectívoro



Frugívoro



Nectarívoro


Alimentación



Picaflor enmascarado

Masked flowerpiercer

Diglossa cyanea



Autor de la ficha: Juan Felipe del Castillo Téllez.

Foto: Miguel Moreno Palacios

Etimología:

La palabra *diglossa* significa dos lenguas, refiriéndose a la lengua como bífida de los miembros de este género que les sirve para recolectar néctar; su epíteto *cyanea* proviene del latín *cyaneus*, refiriéndose a que tiene color azul oscuro.

Descripción:

Este picaflor tiene una máscara negra con un iris de color rojo, el pico es negro con la punta en forma de gancho. El resto de las partes del cuerpo son teñidas de azul oscuro, aunque sus plumas coberteras, remeras y terciarias son negras con borde azul oscuro, al igual que las plumas de la cola; las patas son de color negro marrón.

Aspectos ecológicos:

Esta especie de zonas altas habita el bosque húmedo andino y los bordes de bosque entre los 1800 a 3600 m s. n. m. Forrajea en las partes media-alta del bosque, con bandadas mixtas, especialmente de néctar, pequeños frutos e insectos.



Insectívoro



Frugívoro




Nectarívoro

Alimentación

Volatinero negro

Blue-black Grassquit

Volatinia jacarina



Autor de la ficha: Beatriz Méndez Cubillos.

Foto: Jorge García Melo

Etimología:


El género *Volatinia* de raíces griegas, es el diminutivo de *volatus* referido a vuelo; el epíteto *jacarina* derivado de *jacarini*, de la lengua Tupi, al referirse que vuela de arriba abajo.

Aspectos ecológicos:

Se observa principalmente en zonas secas en donde es muy abundante, en áreas abiertas, en vegetación arbustiva, matorral o en desarrollo y pastizales altos. Se alimenta principalmente de semillas de pastos (Poaceae) en donde comúnmente se observa colgado forrajeando; también se puede ver consumiendo pequeños frutos e insectos. En temporada reproductiva canta enérgicamente, posado sobre una percha baja, desde donde hace saltos verticales durante gran parte del día.

Descripción:

El cuerpo, en general, es de color negro azulado brillante, con pico cónico gris azulado claro y con las alas negras. Las hembras y las crías son de color café marrón claro, más oscuro en las partes por encima; desde el pecho hasta el abdomen se presentan estrías café oscuro.




Alimentación



Tángara de hombros blancos

White-shouldered tanager

Loriotus luctuosus.



Autor de la ficha: Jovany Celemín.

Foto: Gisella Sanchez Castiblanco

Etimología:

El género *Loriotus* se origina de la palabra francesa *loriot* para referirse a ave parecida a una oropéndola (sinónimo de *Tachyphonus*). El epíteto *luctuosus* es una palabra latina que significa lúgubre.

Descripción:

De tamaño mediano; su cabeza y demás partes del cuerpo son de color negro azabache con pico negro y hombros de color blanco.

Esta especie presenta dimorfismo sexual, ya que la hembra tiene su cabeza de color gris y garganta blanquecina, con su espalda color oliva y partes inferiores amarillo.

Aspectos ecológicos:

Se observa principalmente en bosques húmedos, bordes de bosque, bosques secundarios y riparios. Es una especie frugívora-insectívora, que se distribuye ampliamente en Colombia. En época reproductiva, el macho, para defender su territorio, hincha sus coberteras para exhibir el parche blanco de sus hombros.

Por lo general forrajea en estratos medios a altos, con cantos suaves y poco llamativos.




Insectívoro



Frugívoro

Alimentación

Güicha hormiguera Gray-headed Tanager *Eucometis penicillata*



Autor de la ficha: Yair Guillermo Molina Martínez.

Foto: Nicolás Vargas

Etimología:

El género *Eucometis* se deriva de la palabra griega *eukomēs* que significa con cabello encantador, lo que posiblemente hace referencia a la cabeza que presenta la especie.

El epíteto *penicillata* se origina de la palabra latina *penicillus* que significa cepillo o brocha, para denotar que la especie presenta una cresta hacia atrás en la cabeza.



Descripción:

Muestra una pequeña cresta hacia atrás de color grisáceo blanquecino; máscara gris oscuro extendida hasta la nuca, con las demás partes de la cabeza gris a gris blanquecino en auriculares, área de la bigotera y garganta. La espalda, coberteras alares y cola de color amarillo olivá; alas negras con amplios bordes amarillos olivá. Las demás partes ventralmente son de amarillo brillante. El pico es negro y las patas rosadas oscuras.

Aspectos ecológicos:

Se distribuye por debajo de los 1700 m s. n. m., principalmente en bosques secos y húmedos, en el interior y en sus bordes. Usualmente en parejas o siguiendo bandadas mixtas, pueden seguir hormigas soldado, capturando insectos y otros macroinvertebrados que son ahuyentados por estas. A diferencia de otras tángaras, estas se mueven principalmente en estratos bajos y con mayor frecuencia en el interior del bosque; puede llegar a comederos y consumir banano o plátano.



Preocupación menor




Insectívoro



Frugívoro

Alimentación

Cardenal pico de plata Crimson-backed Tanager *Ramphocelus dimidiatus*



Autor de la ficha: Beatriz Méndez Cubillos.

Foto: Jorge García Melo

Etimología:

El género *Ramphocelus* se deriva del griego *rhámpfos* y *kailos* refiriéndose a pico cóncavo, respectivamente. El epíteto *dimidiatus* proviene de la raíz latina *dimidius* que significa medio.

Aspectos ecológicos:

Se distribuye ampliamente en bordes de bosque, matorrales desde el bosque seco hasta el húmedo, a veces llegando a zonas altas. Se alimenta típicamente de insectos y pequeños frutos, se ha observado consumiendo frutos de guayaba y llega fácilmente a consumir bananos en comederos artificiales. Usualmente en parejas o grupos, en estratos bajos a altos, reconocido por sus llamados simples.



El pico del macho es grueso, de color negro, con una mancha blanca plateada contrastante hacia la base de la mandíbula inferior; en general, presenta una coloración roja escarlata, más oscura en el dorso. Las alas, la cola y el centro del abdomen son de color negro. La hembra es similar, pero con un rojo sanguinolento más oscuro en la cabeza, pecho y espalda; el pico, a diferencia del macho, no presenta mancha blanca.



Preocupación menor



Endémico



Insectívoro




Frugívoro

Alimentación

Mielero de cara negra

Black - faced Dacnis

Dacnis lineata



Autor de la ficha: José Sosa Salgado.

Foto: Miguel Moreno Palacios / Luis Eduardo Urueña

Etimología:

Del griego *daknis* que significa tipo de ave de Egipto a orillas del Nilo; *lineata* proveniente del latín *lineatus*, con líneas.

Aspectos ecológicos:

Pertenece al grupo funcional de los frugívoros, permitiendo la diseminación de semillas para generar las condiciones de regeneración natural de los bosques. Su proteína la obtiene de la caza intensiva de insectos interceptados vivazmente debajo o sobre las hojas, hendiduras y cortezas de ramas de árboles que frecuenta a mediana altura. Particularmente visita los comederos artificiales con frutas, especialmente plátanos. Es un ave frecuente en el municipio de Ibagué todo el año.



Descripción:

Ave muy vistosa por su gama de colores, azul turquesa, negro y amarillo claro. El pico es corto y agudo de color negro, color que se extiende desde la base del pico, la cara y se proyecta a la espalda, sus alas y la cola. La cabeza presenta una corona o capucha azul turquesa; color azul turquesa que se presenta por debajo desde la base del pico por la garganta, el cuello y los flancos; el hombro es de color amarillo, igual que los muslos y sus ojos que generan un gran contraste con su máscara negra. Presenta dimorfismo sexual. La hembra presenta una tonalidad general verde oliva y tiene como constante su ojo amarillo contrastante.




Alimentación



Semillero gris

Gray seedeater

Sporophila intermedia



Autor de la ficha: Marta Lucía Arbeláez.


Foto: Luis Eduardo Urueña / Mayra Marulanda

Etimología:

Su nombre derivada de las raíces griegas *sporos*, que significa semilla, *philos*, amante, del latín *intermedia*, que en general significa amante de las semillas intermedio.

Aspectos ecológicos:

Principalmente de hábitat abiertos, en claros de bosque enmalezados, zonas de cultivos y pastizales, alimentándose de semillas de pastos; algunas veces se ven atrapando insectos en temporada seca.



Descripción:

Su cabeza y demás partes superiores, incluyendo el cuello son de color gris azulado, presentando estrías muy difuminadas en su espalda, manto y cabeza. Con pico robusto y con culmen de curvado de color naranja rosáceo. El pecho y vientre presentan color blanco grisáceo; con patas, cola y coberteras alares negruzcas; la base de las plumas primarias es de color blanco, que al cerrar el ala muestra una mancha blanca contrastante. La hembra es de color café anteado desde la coronilla hasta la cola, en la cara, garganta y pecho el color café es más pálido.




Alimentación

Espiguero capuchino

Bellied seedeater

Sporophila nigricollis



Autor de la ficha: Yolanda Mosos Angarita.
Foto: Nicolás Vargas / Rossmayra Marulanda

Etimología:

El género *Sporophila* se deriva de las raíces griegas *spóros* referido a semillas y *phílos* a amante, amante de semillas. El epíteto *nigricollis* se deriva de las palabras latinas *niger* y *collis*, referido a que presenta un collar negro.

Aspectos ecológicos:

Se alimenta de semillas de gramíneas; en general en pareja o en grupos. Abundante en zonas rurales con hábitats abiertos como pastizales y áreas de cultivo, pero también comúnmente en ciudades en lotes baldíos, parques y jardines.

Descripción:

Presenta dimorfismo sexual, el macho tiene su cabeza, la nuca y el cuello de color negro. El pecho, abdomen y demás partes por debajo son de color amarillo claro. Su dorso, rabadilla y cola son de color verde oliva a café oliva. El pico es corto y grueso, de color gris blancuzco a azulado. La hembra presenta todo su plumaje café, más oscuro en parte dorsales. El pico es corto y negro. En ambos casos las patas son de color gris negruzco.



Preocupación menor




Alimentación



Saltátor oliva

Buff-throated Saltator

Saltator maximus



Autor de la ficha: Patricia Hurtado Vargas.

Foto: Jorge García Melo

Etimología:

El género *Saltator* es una palabra latina que significa bailarín; el epíteto *maximus* igualmente significa el más grande, es decir, el saltador más grande.

Aspectos ecológicos:

Se distribuye ampliamente hasta los 1700 m s. n. m., en vegetación secundaria alta, áreas abiertas arboladas y bordes de bosque, usualmente en estratos medios a altos. Se alimenta principalmente de frutos, flores, botones tiernos y, en ocasiones, al parecer de néctar y hojas; en menor proporción pueden consumir insectos. Usualmente canta en las mañanas y llega fácilmente a comederos artificiales consumiendo banano y alpiste (Obs. O. Vargas) y particularmente se ha observado consumiendo las inflorescencias (amentos) del yarumo (Obs. N. Vega).

Descripción:

Tiene un pico relativamente corto, de color gris oscuro, la mandíbula superior es más gruesa y ligeramente curva; la coronilla, nuca, dorso, alas y cola son de color verde oliváceo. Los lados de la cara gris, con una superciliar que va de blanco a gris, una marcada lista malar de color negro, mentón blanco y una mancha de color naranja en la garganta; el pecho es de color gris al igual que el vientre, este último es ocre hacia la parte final en las infracaudales.




Alimentación

Saltátor grisáceo

Grayish Saltator

Saltator coerulescens



Autor de la ficha: Yair Guillermo Molina Martínez.

Foto: Jorge García Melo

Etimología:

El género *Saltator* es una palabra latina que significa bailarín; el epíteto *coerulescens* proviene del latín *caerulescens* para referirse a azulado, es decir el saltador azulado.

Aspectos ecológicos:

Se distribuye ampliamente hasta los 1300 m s. n. m., en vegetación secundaria alta, áreas abiertas arboladas y bordes de bosque, en diferentes estratos. Se alimentan principalmente de frutos, hojas y semillas, y ocasionalmente de insectos; aunque llegan a comederos artificiales consumiendo banano, son poco frecuentes. Usualmente solitario, o en parejas en época reproductiva, puede unirse a bandadas mixtas; fabrica su nido en forma de tasa con diferente material vegetal de paja, ramas y raíces, levantado de dos a tres huevos de color verduzco con manchas negruzcas hacia un extremo.



Descripción:

Cabeza y demás partes por encima de color gris oliva oscuro; pico negruzco y grueso, ceja blanca corta, medialuna blanca delgada bordeando el ojo por debajo, mentón y garganta blanca, bordeada lateralmente por una lista negra a lado y lado. El pecho alto y demás partes por debajo teñido variablemente de amarillo oliva, gris oliva y rufo pálido, con coberturas infracaudales rufas pálidas contrastante. Las patas son gris oscuro a negruzcas.



Insectívoro



Granívoro



Frugívoro


Alimentación



Saltátor pío judío

Streaked saltator

Saltator striatipectus



Autor de la ficha: Yolanda Mosos Angarita.

Foto: Jorge García Melo

Etimología:

El nombre *Saltator* deriva del latín y hace referencia a que baila; el *striatipectus* deriva del latín *striatus* y *pectus*, se refiere a que tiene estriado el pecho.

Descripción:

Su cabeza y partes por encima son verde oliva con cejas contrastantes de color blanco; el pico es generalmente negro, corto y grueso. Las partes por debajo son blancas, con el pecho estriado de café grisáceo.

Alas negruzcas con bordes amarillo oliváceo contrastante; la cola es gris oscura, ligeramente bifurcada.

Aspectos ecológicos:

Habita principalmente áreas abiertas en bosques de crecimiento, montes, jardines, cultivos, arbustos y rastrojos o matorrales. Se alimenta de frutas e insectos; usualmente solitaria. Se puede observar alimentándose de banano y alpiste en comederos artificiales (Ob. G. Sánchez). Por lo general canta con mucha frecuencia, durante buena parte del día, principalmente en el estrato medio y alto.



Preocupación menor



Insectívoro




Granívoro



Frugívoro

Alimentación

Mielero común Bananaquit *Coereba flaveola*



Autor de la ficha: Yair Guillermo Molina Martínez.

Foto: Santiago Vargas

Etimología:

El género *Coereba* al parecer es una palabra de la lengua Tupí (*Güirá coereba*) usada para referirse a un ave azul, negro y amarillos; el epíteto *flaveola* se origina como diminutivo de la palabra latina *flavus* para denotar que es de color amarillo.

Descripción:

Las partes dorsalmente de color negro ceniza, con ceja larga y gruesa de color blanco; garganta y lados bajos de la cara de color gris claro, pico medianamente largo, delgado, curvado y en punta. Con un parche blanco en la base de las primarias; y las partes por debajo de color amarillo.

Aspectos ecológicos:

Se distribuye ampliamente hasta los 2000 m s. n. m., en vegetación secundaria alta, áreas abiertas arboladas y bordes de bosque, en diferentes estratos, incluso el dosel. Se alimentan principalmente de néctar y, en menor proporción, de frutos; es considerado un robador de néctar. Es bastante común en áreas urbanas, pudiendo llegar a bebederos artificiales, incluso en casas y tiendas, puede ingresar furtivamente y robar granos de azúcar. Se escucha frecuentemente cantando durante casi todo el día con melodías usualmente repetitivas.



Insectívoro



Frugívoro




Nectarívoro

Alimentación

Semillero cariamarillo

Yellow-faced Grassquit

Tiaris olivaceus



Autor de la ficha: Orlan David Vargas Díaz.

Foto: Miguel Moreno Palacios

Etimología:

Tiaris, con ornamento de cabeza; *olivaceus*, oliváceo.

Aspectos ecológicos:

Se encuentra principalmente en matorrales cercanos a áreas de cultivos, también en pastizales con árboles cercanos, principalmente en zonas húmedas por encima de los 1000 m. Su alimento principal son semillas de pastos, frutos pequeños y brotes.

Canta animadamente en forma de grillo, pudiendo ser confundido con el *Picumnus olivaceus*. Usualmente es un seguidor de la deforestación, muy común en áreas de cultivo de café. Por lo general en parejas y puede llegar a formar bandadas monoespecíficas.



Descripción:

Semillero de 10 cm. Con diferencia de colores entre macho y hembra (dimorfismo sexual). El macho tiene la coronilla, mejillas y pecho de color negro, ceja y garganta amarillo, espalda y alas amarillo oliva, abdomen gris, pico negro y patas grises. La hembra presenta colores menos oscuros, tornándose gris, verde oliva y amarillo claro en ceja y garganta.




Alimentación

Semillero pechinegro

Black-faced Grassquit

Melanospiza bicolor



Autor de la ficha: Miguel Moreno Palacios.

Foto: Jeyson Sanabria Mejía

Etimología:

Melanospiza, pinzón negruzco. Proviene del griego *mélas*, negro, oscuro, y del griego *spiza*, pinzón, ave pequeña. *Bicolor*, de dos colores; del latín *bi*, dos, y *color*, color, haciendo alusión a los colores negro y oliva en los machos.

Aspectos ecológicos:

En Colombia habita zonas bajas del valle del río Magdalena, hasta el Caribe en Santa Marta y La Guajira, por debajo de 1200 m. Generalmente asociado a zonas secas y abiertas, matorrales xerofíticos, pastizales, bordes de camino, zonas urbanas y plantaciones. Se alimenta exclusivamente de semillas, generalmente desde el suelo o colgado de las inflorescencias de pastos. Se puede observar en solitario o en parejas, pero también a menudo en grupos. Para dormir, e incluso para anidar, puede formar pequeñas colonias.

Descripción:

Ave de 10 cm y 10 g. Los machos presentan la parte anterior de la cabeza, garganta, pecho y vientre negro. Nuca, manto, rabadilla, coberteras infracaudales y cola color oliva pálido. Las plumas secundarias con borde oliva amarillento. El pico gris oscuro y las patas rosadas oscuras. Las hembras son oliva pálido por encima y café grisáceo en las partes inferiores. El pico con maxila gris oscuro y mandíbula pálida.




Alimentación



Tángara lorito

Grass-green Tanager

Chlorornis riefferii



Autor de la ficha: Rossmayra Marulanda Bejarano.

Foto: Luis Eduardo Urueña / Yair G. Molina

Etimología:

La palabra *Chlorornis* deriva de las palabras griegas *khloros*, que significa verde, y *ornis*, pájaro, refiriéndose al color de su cuerpo; el nombre de la especie *riefferii* honra a Gabriel Rieffer, un coleccionista en el trópico americano.

Descripción:

Ave con cuerpo robusto casi en su totalidad verde, a excepción de su pico que es rojo coral; parche ocular, patas y plumas bajo la cola rojo anaranjado; los ojos son cafés.

Aspectos ecológicos:

Su alimentación se basa en insectos y frutas, suele unirse a bandadas mixtas o encontrarse en pareja, su hábitat es principalmente los bordes de bosques andinos, distribuyéndose entre 1700 a 3300 m s. n. m.

Por lo general pasa desapercibida, camuflada en la vegetación por su coloración verde; usualmente silenciosas, con cantos no muy llamativos y suaves, se logra avistar por el movimiento del follaje producido por su tamaño.



Insectívoro




Frugívoro

Alimentación

Tángara rastrojera

Scrub Tanager

Stilpnia vitriolina



Autor de la ficha: Miguel Moreno Palacios.

Foto: Jorge García Melo

Etimología:

Stilpnia, del griego *Stilpnos*, brillante. *Vitriolina*, latín *vitreolus*, de cristal, aludiendo, quizás, al efecto de vidrioso que se observa en la coronilla de los adultos cuando les refleja el sol.

Aspectos ecológicos:

Se distribuye principalmente en zonas de bosque seco tropical, en áreas abiertas, matorrales áridos y zonas cultivadas de los valles interandinos (300 m -2500 m), aunque también se puede observar en hábitats húmedos, aparentemente siguiendo la deforestación. Forrajea en solitario o en parejas, pero no en bandadas mixtas, sobre todo porque estas no son frecuentes en zonas abiertas. Se alimenta principalmente de insectos y frutos en arbustos bajos hasta el dosel.



Descripción:

Ave de 14 cm y 20 g. Tiene una amplia coronilla naranja rojiza brillante, un antifaz negro que cubre hasta los auriculares. El pico con maxila negra y mandíbula gris en la base. Las alas y cola turquesa con borde interior de plumas color negro. Las plumas infracaudales color canela pálido, el resto del cuerpo es azul grisáceo claro y las patas grises. La hembra, en general, de color más pálido, con espalda y rabadilla verde grisáceo, no azul.



Preocupación menor



Endémico




Insectívoro



Frugívoro

Alimentación

Tángara de lentejuelas Beryl-spangled Tanager *Tangara nigroviridis*



Autor de la ficha: Miguel Moreno Palacios.

Foto: Miguel Moreno Palacios

Etimología:

Tángara, en lengua Tupí, ave pequeña y multicolor. Las lenguas tupies son una familia de lenguas habladas por aborígenes de América del Sur, principalmente sobre la cuenca del Amazonas. *Nigroviridis*, del latín *niger*, negro, y *viridis*, verde, en alusión a la coloración del plumaje de la especie.



Descripción:

Coronilla amarillo pálido azulado; máscara y espalda negra, alas y cola negras bordeadas de azul verdoso; rabadilla azul verdoso. Las partes inferiores son negras manchadas de azul verdoso o amarillento. El pico con maxila negra y base de la mandíbula gris claro. Las patas son grises.

Aspectos ecológicos:

Habita bosques húmedos, principalmente en ecosistemas montanos sobre la cordillera de los Andes, entre los 1100 m a 3000 m. Frecuente en bordes de bosque, vegetación secundaria y zonas de arbolado disperso. Es común observarla haciendo parte de bandadas mixtas con otras tangeras, forrajeando en búsqueda de frutos (principalmente de *Miconia* sp.) y artrópodos.



Preocupación menor



Insectívoro




Frugívoro

Alimentación

Tángara verdinegra

Metallic-green Tanager

Tangara labradorides



Autor de la ficha: Miguel Moreno Palacios.
Foto: Luis Eduardo Urueña / Miguel Moreno Palacios

Etimología:

Tángara, en lengua Tupí, ave pequeña y multicolor. Las lenguas tupies son una familia de lenguas habladas por aborígenes de América del Sur, principalmente sobre la cuenca del Amazonas. *Labradorides*, del francés *pierre de labrador*, piedra de labrador, feldespato. *Eidês*, semejanza, en alusión a la coloración azul verdosa del plumaje de la especie.

Descripción:

El centro de la coronilla y nuca son negras, con una pequeña máscara negra que apenas cubre los ojos. La garganta, pecho, espalda, rabadilla y flancos color azul brillante, a veces verdoso, dependiendo de la luz. Las alas y cola negras marginadas de azul. El abdomen y coberturas infracaudales color canela pálido.

Aspectos ecológicos:

Habita bosques húmedos en ecosistemas montanos de la cordillera de los Andes, entre los 1300 m y 2400 m. Común en bordes de bosque, matorral secundario y pastizales enmalezados. Frecuentemente vista en bandadas con otras tångaras, principalmente en búsqueda de frutos, aparentemente con preferencia de *Miconia* sp., pero también consumiendo insectos y otros artrópodos que se encuentran en las hojas.




Alimentación



Tángara cabecirroja

Bay-headed Tanager

Tangara gyrola



Autor de la ficha: Juan Manuel Currea.

Foto: Jorge García Melo

Etimología:

Tángara proviene de la lengua tupí para hacer referencia a las especies coloridas de este género. El epíteto *gyrola* proviene de la palabra latina *gyrus* y significa anillo o círculo.

Descripción:

Es un ave con colores vivos. En la coronilla, lados de la cabeza y parte superior de la garganta es de color rojo castaño, collar nual de amarillo dorado, por lo general, imperceptible; lomo verde, rabadilla azul brillante. Las partes inferiores azul celeste brillante, infracaudales verde. Plumas en tibia de color castaño; alas y cola verdes.

Aspectos ecológicos:

Distribuida por debajo de los 2200 m s. n. m., busca activamente su alimento desde arbustos bajos hasta las copas de los árboles. Se alimenta de insectos y pequeños frutos; usualmente social, vista con frecuencia en parejas, en zonas abiertas, preferiblemente arboladas, desde áreas urbanas donde es escasa, hasta zonas de cultivos y bordes de bosque. Las hembras construyen el nido e incuban los huevos, los cuales son de color blanco con manchas marrón; ambos adultos alimentan a las crías.



Preocupación menor



Insectívoro




Frugívoro

Alimentación

Azulejo común

Blue and gray Tanager

Thraupis episcopus



Autor de la ficha: Yair Guillermo Molina Martínez.

Foto: Jorge García Melo

Etimología:

El género *Thraupis* es una palabra latina que hace referencia a tângara; el epíteto *epicopus*, proviene del latín *episcopalis* que referencia a obispo o episcopado. En ornitología hace referencia al color azul.

Descripción:

En general presenta una coloración gris azulado claro, con la espalda, alas y cola de color azul; las plumas de las alas secundarias y primarias presentan bordes internos negros o, incluso, solo el borde es azul. Se nota una media luna azul contrastante en el hombro (escapulares). El pico negro a grisáceo plateado oscuro.

Aspectos ecológicos:

La especie se distribuye en toda Colombia, desde zonas bajas hasta medias (2600 m s. n. m.). Principalmente asociada a áreas abiertas arboladas, en parques, jardines en zonas urbanas hasta bordes de bosque y matorrales en zonas rurales y naturales. Se alimenta principalmente de frutos e insectos; es visitante frecuente en comederos artificiales. Se puede observar alimentándose de frutales como guayaba, papaya y banano; también de frutos de yarumo (*Cecropia* sp.), mango (*Mangifera indica*) y peras de Malaca (*Syzygium malaccense*) (Obs. Teresa Castiblanco).



Insectívoro



Frugívoro


Alimentación



Azulejo palmero

Palm Tanager

Thraupis palmarum



Autor de la ficha: Patricia Hurtado Vargas.

Foto: Jorge García Melo

Etimología:

El género *Thraupis* es una palabra latina que hace referencia a tângara; el epíteto *palmarum*, también es una palabra latina que referencia el árbol de palma. Seguramente hace referencia a tangara palmera, ya que la especie visita y anida en este tipo de plantas.

Descripción:

La zona cerca al pico es color gris azulada; la coloración de su cuerpo es oliva grisácea. En la coronilla y zonas cercanas al ojo tiene algunos destellos de amarillo; la mitad inferior de las alas y la cola son de color gris oscuro.

Aspectos ecológicos:

Es una especie que se distribuye en toda Colombia, desde zonas bajas hasta medias (2300 m s. n. m.). Principalmente asociada a áreas abiertas arboladas, que van desde parques y jardines en zonas urbanas hasta bordes de bosque y matorrales en zonas rurales y naturales. Se alimenta principalmente de frutos e insectos; es visitante frecuente en comederos artificiales.



Insectívoro



Frugívoro

Alimentación



Referencias

- Asociación Colombiana de Ornitología (Aco). (2020): Lista de referencia de especies de aves de Colombia - 2020. v2. Asociación Colombiana de Ornitología. Dataset/Checklist. <http://doi.org/10.15472/qhszOp>.
- Ayerbe-Quiñones, F. (2018). *Guía Ilustrada de la Avifauna Colombiana*. Serie de libros Avifauna Colombiana. Santiago de Cali: Wildlife Conservation Society-WCS Colombia. Panamericana Formas e Impresos S.A.
- Clements, J. F., T. S., Schulenberg, M. J., Iliff, S. M., Billerman, T. A., Fredericks, B. L., Sullivan, & Wood, C. L. (2019). *The eBird/Clements Checklist of Birds of the World: v2019*. Recuperado de <https://www.birds.cornell.edu/clementschecklist/download/>
- Conradie, N., & van Zyl, C. (2013). Agreement of the international avitourist market to ecotourism principles: A South African development perspective. *African Journal of Business Management*, 7(30), 3013-3021.
- Cordell K.H., & Super, G.R. (2000). Trends in Americans' Outdoor Recreation Participation. En W.C. Gartner and D.W. Lime (Ed.), *Trends in Outdoor Recreation, Leisure, and Tourism*, (pp. 75-90). Oxon, UK: CABI Publishing.
- Hilty, S. L. & Brown, W. L. (1986). *A Guide to the Birds of Colombia*. Princeton: Princeton University Press.
- Hvenegaard, G.T., & Dearden, P. (1998). Linking ecotourism and biodiversity conservation: A case study of Doi Inthanon National Park, Thailand. *Singapore Journal of Tropical Geography*, 19(2), 193-211.
- Molina-Martínez, Y.G. (2014). Birds of the Totare River Basin, Colombia. *Check List*, 10(2), 269-286.
- Ocampo-Peñuela N., & Winton, R. S. (2017). Economic and conservation potential of bird-watching tourism in postconflict Colombia. *Tropical Conservation Science*, 10, 1 - 6.
- Parra-Hernández, R.M., Carantón-Ayala, D.A. Sanabria-Mejía, J.S., Barreira-Rodríguez, L.F., Sierra-Sierra, A.M., Moreno-Palacios, M.C., Yate-Molina, W.S., Figueroa-Martínez, W.E. Díaz-Jaramillo, C., Florez Delgado, V.T., Certuche-Cubillos, J.K., Loaiza-Hernández H.N., y Florido-Cuellar, B.A. (2007). Aves del municipio de Ibagué - Tolima, Colombia. *Biota Colombiana*, 8(2), 199-220.



- Parra-Hernández, R., & Molina-Martínez, Y. *Birds of Tolima department in Colombia's central andean region. Biodiversity Data Journal. In review.*
- Puhakka, L., Salo, M. & Sääksjärvi, I.E. (2011). Bird diversity, birdwatching tourism and conservation in Peru: A geographic analysis. *PLOS ONE*, 6: e26786.
- Remsen, J. V. Jr., Areta, J. I., Bonaccorso, E., Claramunt, S., Jaramillo, A., Pacheco, J.F., Robbins, M.B., Stiles, F.G., Stotz, D.F., & Zimmer, K.J. (2020). *A classification of the bird species of South America. American Ornithological Society.* <http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm>
- Renjifo, L.M., Gómez, M.F., Velasquez, J., Amaya, A.M., Kattan, G.H., Amaya, J.D. & Burbano, J. (2014). *Libro rojo de aves de Colombia Vol I. Bosques húmedos de los Andes y la Costa Pacífica.* Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana.
- Steven, R., Castley, J.G. & Buckley, R. (2013). Tourism revenue as a conservation tool for threatened birds in protected areas. *PLOS ONE* 8, e62598.
- Steven, R., Morrison, C. & Castley, J.G. (2015). Bird watching and avitourism: A global review of research into its participant markets, distribution and impacts, highlighting future research priorities to inform sustainable avitourism management. *Journal of Sustainable Tourism*, 23(8-9), 1257-1276.
- Welford, M. & Barilla, A. (2013). Is neotropical conservation sold-short: Diminishing returns for birding suggest ecolodges could encourage longer stays. *Journal for Nature Conservation*, 21(6), 401– 405.



Lista de chequeo de las AVES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

#	Nombre científico	#	Nombre científico	#	Nombre científico
☐ 1	Nothocercus julius	☐ 25	Podilymbus podiceps	☐ 49	Piaya cayana
☐ 2	Nothocercus bonapartei	☐ 26	Columba livia	☐ 50	Coccyzus melacoryphus
☐ 3	Tinamus major	☐ 27	Patagioenas fasciata	☐ 51	Coccyzus americanus
☐ 4	Crypturellus soui	☐ 28	Patagioenas cayennensis	☐ 52	Coccyzus erythrophthalmus
☐ 5	Dendrocygna viduata	☐ 29	Patagioenas subvinacea	☐ 53	Steatornis caripensis
☐ 6	Dendrocygna autumnalis	☐ 30	Streptopelia decaocto	☐ 54	Nyctibius griseus
☐ 7	Oressochen jubatus	☐ 31	Geotrygon montana	☐ 55	Chordeiles nacunda
☐ 8	Cairina moschata	☐ 32	Leptotila verreauxi	☐ 56	Chordeiles acutipennis
☐ 9	Merganetta armata	☐ 33	Leptotila conoveri	☐ 57	Chordeiles minor
☐ 10	Spatula discors	☐ 34	Leptotila plumbeiceps	☐ 58	Lurocalis rufiventris
☐ 11	Spatula clypeata	☐ 35	Zenitrygon frenata	☐ 59	Systellura longirostris
☐ 12	Anas platyrhynchos	☐ 36	Zenitrygon linearis	☐ 60	Nyctidromus albigollis
☐ 13	Anas andium	☐ 37	Zenaida auriculata	☐ 61	Uropsalis segmentata
☐ 14	Aythya affinis	☐ 38	Claravis pretiosa	☐ 62	Uropsalis lyra
☐ 15	Nomonyx dominicus	☐ 39	Columbina passerina	☐ 63	Hydropsalis cayennensis
☐ 16	Oxyura jamaicensis	☐ 40	Columbina minuta	☐ 64	Antrostomus carolinensis
☐ 17	Chamaepetes goudotii	☐ 41	Columbina talpacoti	☐ 65	Cypseloides cherriei
☐ 18	Penelope montagnii	☐ 42	Crotophaga major	☐ 66	Streptoprocne rutila
☐ 19	Aburria aburri	☐ 43	Crotophaga ani	☐ 67	Streptoprocne zonaris
☐ 20	Ortalis columbiana	☐ 44	Crotophaga sulcirostris	☐ 68	Chaetura spinicaudus
☐ 21	Colinus cristatus	☐ 45	Tapera naevia	☐ 69	Chaetura cinereiventris
☐ 22	Odontophorus hyperythrus	☐ 46	Dromococcyx phasianellus	☐ 70	Chaetura pelagica
☐ 23	Phoenicopiterus ruber	☐ 47	Coccyzua minuta	☐ 71	Chaetura brachyura
☐ 24	Tachybaptus dominicus	☐ 48	Coccyzua pumila	☐ 72	Aeronautes montivagus



#	Nombre científico	#	Nombre científico	#	Nombre científico
□ 73	Panyptila cayennensis	□ 99	Haplophaedia aureliae	□ 125	Uranomitra francae
□ 74	Florisuga mellivora	□ 100	Eriocnemis derbyi	□ 126	Chrysurnia goudoti
□ 75	Eutoxeres aquila	□ 101	Eriocnemis mosquera	□ 127	Polyerata amabilis
□ 76	Glaucis hirsutus	□ 102	Aglaeactis cupripennis	□ 128	Chlorestes julie
□ 77	Phaethornis striigularis	□ 103	Coeligena coeligena	□ 129	Aramus guarauna
□ 78	Phaethornis anthophilus	□ 104	Coeligena torquata	□ 130	Porphyrio martinica
□ 79	Phaethornis guy	□ 105	Coeligena lutetiae	□ 131	Anurolimnas viridis
□ 80	Phaethornis symmatophorus	□ 106	Lafresnaya lafresnayi	□ 132	Laterallus albigularis
□ 81	Doryfera ludoviciae	□ 107	Ensifera ensifera	□ 133	Pardirallus maculatus
□ 82	Schistes albogularis	□ 108	Pterophanes cyanopterus	□ 134	Aramides cajaneus
□ 83	Colibri delphinae	□ 109	Boissonneaua flavescens	□ 135	Porzana carolina
□ 84	Colibri cyanotus	□ 110	Ocreatus underwoodii	□ 136	Gallinula galeata
□ 85	Colibri coruscans	□ 111	Heliodoxa rubinoides	□ 137	Pluvialis dominica
□ 86	Chrysolampis mosquitus	□ 112	Heliomaster longirostris	□ 138	Vanellus chilensis
□ 87	Anthracothonax nigricollis	□ 113	Chaetocercus mulsant	□ 139	Vanellus resplendens
□ 88	Heliangelus exortis	□ 114	Chaetocercus heliodor	□ 140	Charadrius collaris
□ 89	Lophornis de-lattrei	□ 115	Calliphlox mitchellii	□ 141	Himantopus mexicanus
□ 90	Adelomyia melanogenys	□ 116	Chlorostilbon melanorhynchus	□ 142	Burhinus bistriatus
□ 91	Agelaiocercus kingii	□ 117	Chlorostilbon gibsoni	□ 143	Calidris bairdii
□ 92	Opisthoprora euryptera	□ 118	Anthocephala berlepschi	□ 144	Calidris minutilla
□ 93	Lesbia nuna	□ 119	Campylopterus falcatus	□ 145	Calidris melanotos
□ 94	Ramphomicron microrhynchum	□ 120	Chalybura buffonii	□ 146	Calidris mauri
□ 95	Chalcostigma herrani	□ 121	Thalurania colombica	□ 147	Gallinago jamesoni
□ 96	Oxyopogon stubelii	□ 122	Saucerottia saucerottei	□ 148	Gallinago nobilis
□ 97	Metallura tyrianthina	□ 123	Saucerottia cyanifrons	□ 149	Gallinago delicata
□ 98	Metallura williamsi	□ 124	Amazilia tzacatl	□ 150	Actitis macularius

#	Nombre científico	#	Nombre científico	#	Nombre científico
☐ 151	Tringa solitaria	☐ 177	Vultur gryphus	☐ 203	Buteo nitidus
☐ 152	Tringa melanoleuca	☐ 178	Coragyps atratus	☐ 204	Buteo platypterus
☐ 153	Tringa flavipes	☐ 179	Cathartes aura	☐ 205	Buteo albigula
☐ 154	Jacana jacana	☐ 180	Cathartes burrovianus	☐ 206	Buteo brachyurus
☐ 155	Rynchops niger	☐ 181	Pandion haliaetus	☐ 207	Buteo swainsoni
☐ 156	Leucophaeus atricilla	☐ 182	Elanus leucurus	☐ 208	Buteo ventralis
☐ 157	Mycteria americana	☐ 183	Gampsonyx swainsonii	☐ 209	Tyto alba
☐ 158	Anhinga anhinga	☐ 184	Elanoides forficatus	☐ 210	Megascops albogularis
☐ 159	Phalacrocorax brasilianus	☐ 185	Spizaetus tyrannus	☐ 211	Megascops choliba
☐ 160	Tigrisoma lineatum	☐ 186	Spizaetus isidori	☐ 212	Bubo virginianus
☐ 161	Cochlearius cochlearius	☐ 187	Busarellus nigricollis	☐ 213	Ciccaba virgata
☐ 162	Ixobrychus exilis	☐ 188	Rostrhamus sociabilis	☐ 214	Ciccaba nigrolineata
☐ 163	Nycticorax nycticorax	☐ 189	Ictinia mississippiensis	☐ 215	Ciccaba albitarsis
☐ 164	Butorides virescens	☐ 190	Ictinia plumbea	☐ 216	Glaucidium jardinii
☐ 165	Butorides striata	☐ 191	Circus buffoni	☐ 217	Glaucidium brasilianum
☐ 166	Bubulcus ibis	☐ 192	Accipiter striatus	☐ 218	Athene cunicularia
☐ 167	Ardea cocoi	☐ 193	Geranoospiza caerulescens	☐ 219	Aegolius harrisii
☐ 168	Ardea alba	☐ 194	Buteogallus meridionalis	☐ 220	Asio clamator
☐ 169	Syrigma sibilatrix	☐ 195	Buteogallus solitarius	☐ 221	Asio stygius
☐ 170	Ptilerodius pileatus	☐ 196	Morphnarchus princeps	☐ 222	Asio flammeus
☐ 171	Egretta thula	☐ 197	Rupornis magnirostris	☐ 223	Pharomachrus auriceps
☐ 172	Egretta caerulea	☐ 198	Parabuteo unicinctus	☐ 224	Pharomachrus antisianus
☐ 173	Plegadis falcinellus	☐ 199	Parabuteo leucorrhous	☐ 225	Trogon collaris
☐ 174	Phimosus infuscatus	☐ 200	Gerenoaetus albicaudatus	☐ 226	Trogon personatus
☐ 175	Theristicus caudatus	☐ 201	Gerenoaetus polyosoma	☐ 227	Momotus subrufescens
☐ 176	Sarcoramphus papa	☐ 202	Geranoaetus melanoleucus	☐ 228	Momotus aequatorialis



#	Nombre científico	#	Nombre científico	#	Nombre científico
□ 229	Megaceryle torquata	□ 255	Caracara cheriway	□ 281	Thamnophilus multistriatus
□ 230	Chloroceryle amazona	□ 256	Phalcobaenus carunculatus	□ 282	Thamnophilus atrinucha
□ 231	Chloroceryle americana	□ 257	Milvago chimachima	□ 283	Thamnophilus unicolor
□ 232	Galbula ruficauda	□ 258	Falco sparverius	□ 284	Dysithamnus mentalis
□ 233	Nystalus radiatus	□ 259	Falco columbarius	□ 285	Epinecrophylla fulviventris
□ 234	Malacoptila mysticalis	□ 260	Falco rufigularis	□ 286	Myrmotherula axillaris
□ 235	Aulacorhynchus prasinus	□ 261	Falco femoralis	□ 287	Formicivora grisea
□ 236	Aulacorhynchus haematopygus	□ 262	Falco peregrinus	□ 288	Drymophila striaticeps
□ 237	Andigena hypoglauca	□ 263	Bolborhynchus lineola	□ 289	Cercomacroides tyrannina
□ 238	Andigena nigrirostris	□ 264	Bolborhynchus ferrugineifrons	□ 290	Myrmeciza longipes
□ 239	Picumnus olivaceus	□ 265	Brotogeris jugularis	□ 291	Sipia palliata
□ 240	Melanerpes formicivorus	□ 266	Hapalopsittaca fuentesi	□ 292	Hafferia immaculata
□ 241	Melanerpes rubricapillus	□ 267	Pionus tumultuosus	□ 293	Grallaria squamigera
□ 242	Dryobates fumigatus	□ 268	Pionus menstruus	□ 294	Grallaria ruficapilla
□ 243	Dryobates kirkii	□ 269	Pionus chalcopterus	□ 295	Grallaria rufocinerea
□ 244	Dryobates dignus	□ 270	Amazona ochrocephala	□ 296	Grallaria nuchalis
□ 245	Dryobates nigriceps	□ 271	Amazona amazonica	□ 297	Grallaria rufula
□ 246	Campephilus pollens	□ 272	Amazona mercenarius	□ 298	Grallaria quitensis
□ 247	Campephilus melanoleucos	□ 273	Forpus conspicillatus	□ 299	Grallaria alleni
□ 248	Dryocopus lineatus	□ 274	Eupsittula pertinax	□ 300	Grallaria milleri
□ 249	Colaptes rubiginosus	□ 275	Ara severus	□ 301	Grallaricula lineifrons
□ 250	Colaptes rivolii	□ 276	Leptosittaca branickii	□ 302	Grallaricula nana
□ 251	Colaptes punctigula	□ 277	Ognorhynchus icterotis	□ 303	Acropternis orthonix
□ 252	Herpetotheres cachinnans	□ 278	Psittacara wagleri	□ 304	Myornis senilis
□ 253	Micrastur ruficollis	□ 279	Taraba major	□ 305	Scytalopus latrans
□ 254	Micrastur semitorquatus	□ 280	Thamnophilus doliatus	□ 306	Scytalopus atratus

#	Nombre científico	#	Nombre científico	#	Nombre científico
□ 307	Scytalopus spillmani	□ 333	Thripadectes holostictus	□ 359	Pachyramphus versicolor
□ 308	Scytalopus opacus	□ 334	Thripadectes virgaticeps	□ 360	Pachyramphus rufus
□ 309	Chamaeza mollissima	□ 335	Automolus ochrolaemus	□ 361	Pachyramphus cinnamomeus
□ 310	Dendrocicla tyrannina	□ 336	Premnoplex brunnescens	□ 362	Pachyramphus polychropterus
□ 311	Dendrocicla fuliginosa	□ 337	Margarornis squamiger	□ 363	Platyrinchus mystaceus
□ 312	Dendrocolaptes picumnus	□ 338	Leptasthenura andicola	□ 364	Pseudotriccus ruficeps
□ 313	Xiphocolaptes promeropirhynchus	□ 339	Hellmayrea gularis	□ 365	Phylloscartes poecilotis
□ 314	Xiphorhynchus susurrans	□ 340	Asthenes flammulata	□ 366	Phylloscartes ophthalmicus
□ 315	Xiphorhynchus triangularis	□ 341	Asthenes fuliginosa	□ 367	Mionectes striaticollis
□ 316	Dendroplex picus	□ 342	Siptornis striaticollis	□ 368	Mionectes oleagineus
□ 317	Campylorhamphus trochilrostris	□ 343	Certhiaxis cinnamomeus	□ 369	Leptopogon amaurocephalus
□ 318	Campylorhamphus pusillus	□ 344	Synallaxis brachyura	□ 370	Leptopogon superciliaris
□ 319	Lepidocolaptes souleyetii	□ 345	Synallaxis albens	□ 371	Leptopogon rufipectus
□ 320	Lepidocolaptes lacrymiger	□ 346	Synallaxis azarae	□ 372	Tolmomyias sulphurescens
□ 321	Xenops minutus	□ 347	Synallaxis unirufa	□ 373	Lophotriccus pileatus
□ 322	Xenops rutilans	□ 348	Chloropipo flavicapilla	□ 374	Atalotriccus pilaris
□ 323	Pseudocolaptes boissonneautii	□ 349	Chiroxiphia lanceolata	□ 375	Hemitriccus margaritaceiventer
□ 324	Premnornis guttuliger	□ 350	Masius chrysoterpis	□ 376	Hemitriccus granadensis
□ 325	Lochmias nematura	□ 351	Manacus manacus	□ 377	Poecilotriccus ruficeps
□ 326	Cinclodes excelsior	□ 352	Ceratopipra erythrocephala	□ 378	Poecilotriccus sylvia
□ 327	Cinclodes albidiventris	□ 353	Pipreola riefferii	□ 379	Todirostrum cinereum
□ 328	Anabacerthia striaticollis	□ 354	Pipreola arcuata	□ 380	Nephelomyias pulcher
□ 329	Syndactyla subalaris	□ 355	Ampelion rubrocrissatus	□ 381	Hirundinea ferruginea
□ 330	Dendroma rufa	□ 356	Rupicola peruviana	□ 382	Pyrrhomyias cinnamomeus
□ 331	Clibanornis rubiginosus	□ 357	Lipaugus fuscocinereus	□ 383	Zimmerius chrysops
□ 332	Thripadectes flammulatus	□ 358	Tityra inquisitor	□ 384	Euscarthmus meloryphus



#	Nombre científico	#	Nombre científico	#	Nombre científico
□ 385	Camptostoma obsoletum	□ 411	Pitangus lictor	□ 437	Ochthoeca fumicolor
□ 386	Elaenia flavogaster	□ 412	Machetornis rixosa	□ 438	Pyrocephalus rubinus
□ 387	Elaenia parvirostris	□ 413	Megarhynchus pitangua	□ 439	Knipolegus poecilurus
□ 388	Elaenia chiriquensis	□ 414	Myiodynastes chrysocephalus	□ 440	Fluvicola pica
□ 389	Elaenia frantzii	□ 415	Myiodynastes leuciventris	□ 441	Arundinicola leucocephala
□ 390	Elaenia pallantagae	□ 416	Myiodynastes maculatus	□ 442	Muscisaxicola alpinus
□ 391	Tyrannulus elatus	□ 417	Myiozetetes cayanensis	□ 443	Myiotheretes striaticollis
□ 392	Myiopagis gaimardii	□ 418	Myiozetetes similis	□ 444	Myiotheretes fumigatus
□ 393	Myiopagis viridicata	□ 419	Conopias cinchoneti	□ 445	Cnemotriccus fuscatus
□ 394	Capsiempis flaveola	□ 420	Empidonomus varius	□ 446	Sayornis nigricans
□ 395	Phyllomyias burmeisteri	□ 421	Tyrannus melancholicus	□ 447	Empidonax virescens
□ 396	Phyllomyias griseiceps	□ 422	Tyrannus savana	□ 448	Empidonax traillii
□ 397	Phyllomyias nigrocapillus	□ 423	Tyrannus tyrannus	□ 449	Empidonax alnorum
□ 398	Phyllomyias cinereiceps	□ 424	Tyrannus dominicensis	□ 450	Contopus cooperi
□ 399	Phyllomyias uropygialis	□ 425	Myiarchus tuberculifer	□ 451	Contopus fumigatus
□ 400	Phyllomyias plumbeiceps	□ 426	Myiarchus panamensis	□ 452	Contopus sordidulus
□ 401	Phaeomyias murina	□ 427	Myiarchus apicalis	□ 453	Contopus virens
□ 402	Mecocerculus poecilocercus	□ 428	Myiarchus cephalotes	□ 454	Contopus cinereus
□ 403	Mecocerculus stictopterus	□ 429	Myiarchus crinitus	□ 455	Cyclarhis gujanensis
□ 404	Mecocerculus leucophrys	□ 430	Myiarchus tyrannulus	□ 456	Cyclarhis nigristrois
□ 405	Mecocerculus minor	□ 431	Myiophobus flavicans	□ 457	Hylophilus flavipes
□ 406	Pseudocoloteryx acutipennis	□ 432	Myiophobus fasciatus	□ 458	Pachysylvia decurtata
□ 407	Serpophaga cinerea	□ 433	Ochthoeca frontalis	□ 459	Pachysylvia semibrunnea
□ 408	Uromyias agilis	□ 434	Ochthoeca diadema	□ 460	Vireo flavifrons
□ 409	Legatus leucophaeus	□ 435	Ochthoeca cinna- momeiventris	□ 461	Vireo philadelphicus
□ 410	Pitangus sulphuratus	□ 436	Ochthoeca rufipectoralis	□ 462	Vireo leucophrys

#	Nombre científico	#	Nombre científico	#	Nombre científico
□ 463	Vireo olivaceus	□ 489	Cantorchilus leucotis	□ 515	Spinus xanthogastrus
□ 464	Vireo flavoviridis	□ 490	Cinnycerthia unirufa	□ 516	Spinus psaltria
□ 465	Vireo altiloquus	□ 491	Cinnycerthia olivascens	□ 517	Euphonia concinna
□ 466	Cyanolyca armillata	□ 492	Henicorhina leucosticta	□ 518	Euphonia lanirostris
□ 467	Cyanocorax affinis	□ 493	Henicorhina leucophrys	□ 519	Euphonia cyanocephala
□ 468	Cyanocorax yncas	□ 494	Cyphorhinus thoracicus	□ 520	Euphonia xanthogaster
□ 469	Pygochelidon cyanoleuca	□ 495	Polioptila plumbea	□ 521	Chlorophonia cyanea
□ 470	Oreocheilidon murina	□ 496	Donacobius atricapilla	□ 522	Chlorophonia pyrrhophrys
□ 471	Oreocheilidon flavipes	□ 497	Cinclus leucocephalus	□ 523	Rhodinocichla rosea
□ 472	Atticora tibialis	□ 498	Myadestes raloides	□ 524	Chlorospingus canicularis
□ 473	Stelgidopteryx ruficollis	□ 499	Catharus aurantiirostris	□ 525	Chlorospingus flavigularis
□ 474	Progne tapera	□ 500	Catharus fuscater	□ 526	Ammodramus humeralis
□ 475	Progne subis	□ 501	Catharus fuscescens	□ 527	Arremonops conirostris
□ 476	Progne chalybea	□ 502	Catharus minimus	□ 528	Arremon assimilis
□ 477	Tachycineta albiventer	□ 503	Catharus ustulatus	□ 529	Arremon aurantiirostris
□ 478	Riparia riparia	□ 504	Turdus leucops	□ 530	Arremon brunneinucha
□ 479	Hirundo rustica	□ 505	Turdus flavipes	□ 531	Zonotrichia capensis
□ 480	Petrochelidon pyrrhonota	□ 506	Turdus leucomelas	□ 532	Atlapetes albinucha
□ 481	Troglodytes aedon	□ 507	Turdus ignobilis	□ 533	Atlapetes flaviceps
□ 482	Troglodytes solstitialis	□ 508	Turdus fuscater	□ 534	Atlapetes schistaceus
□ 483	Cistothorus platensis	□ 509	Turdus serranus	□ 535	Atlapetes pallidinucha
□ 484	Campylorhynchus griseus	□ 510	Mimus gilvus	□ 536	Atlapetes latinuchus
□ 485	Pheugopedius fasciatoventris	□ 511	Lonchura malacca	□ 537	Leistes militaris
□ 486	Pheugopedius mystacalis	□ 512	Lonchura atricapilla	□ 538	Amblyrhampus holosericeus
□ 487	Pheugopedius sclateri	□ 513	Spinus spinescens	□ 539	Psarocolius angustifrons
□ 488	Cantorchilus nigrocapillus	□ 514	Spinus magellanicus	□ 540	Psarocolius decumanus



#	Nombre científico	#	Nombre científico	#	Nombre científico
□ 541	Cacicus cela	□ 567	Setophaga fusca	□ 593	Chlorophanes spiza
□ 542	Cacicus chrysnotus	□ 568	Setophaga petechia	□ 594	Hemithraupis guira
□ 543	Icterus icterus	□ 569	Setophaga pensylvanica	□ 595	Hemithraupis flavicollis
□ 544	Icterus auricapillus	□ 570	Setophaga striata	□ 596	Conirostrum leucogenys
□ 545	Icterus chrysater	□ 571	Myiothlypis luteoviridis	□ 597	Conirostrum sitticolor
□ 546	Icterus galbula	□ 572	Myiothlypis nigrocristata	□ 598	Conirostrum albifrons
□ 547	Icterus nigrogularis	□ 573	Myiothlypis fulvicauda	□ 599	Sicalis citrina
□ 548	Molothrus oryzivorus	□ 574	Myiothlypis coronata	□ 600	Sicalis flaveola
□ 549	Molothrus bonariensis	□ 575	Basileuterus rufifrons	□ 601	Sicalis luteola
□ 550	Quiscalus lugubris	□ 576	Basileuterus tristriatus	□ 602	Geospizopsis unicolor
□ 551	Quiscalus mexicanus	□ 577	Cardellina canadensis	□ 603	Catamenia analis
□ 552	Hypopyrrhus pyrohypogaster	□ 578	Myioborus miniatus	□ 604	Catamenia inornata
□ 553	Gymnomystax mexicanus	□ 579	Myioborus ornatus	□ 605	Catamenia homochroa
□ 554	Chrysomus icterocephalus	□ 580	Mitrospingus cassinii	□ 606	Diglossa lafresnayii
□ 555	Parkesia noveboracensis	□ 581	Piranga flava	□ 607	Diglossa humeralis
□ 556	Vermivora chrysoptera	□ 582	Piranga rubra	□ 608	Diglossa albilatera
□ 557	Mniotilta varia	□ 583	Piranga olivacea	□ 609	Diglossa sittoides
□ 558	Protonotaria citrea	□ 584	Piranga rubriceps	□ 610	Diglossa caerulescens
□ 559	Leiothlypis peregrina	□ 585	Piranga leucoptera	□ 611	Diglossa cyanea
□ 560	Oporornis agilis	□ 586	Habia cristata	□ 612	Haplospiza rustica
□ 561	Geothlypis aequinoctialis	□ 587	Pheucticus ludovicianus	□ 613	Volatinia jacarina
□ 562	Geothlypis philadelphia	□ 588	Cyanoloxia cyanoides	□ 614	Creurgops verticalis
□ 563	Setophaga ruticilla	□ 589	Cyanoloxia brissonii	□ 615	Loriotus luctuosus
□ 564	Setophaga cerulea	□ 590	Spiza americana	□ 616	Tachyphonus rufus
□ 565	Setophaga pitiayumi	□ 591	Sericossypha albocristata	□ 617	Eucometis penicillata
□ 566	Setophaga castanea	□ 592	Catamblyrhynchus diadema	□ 618	Coryphospingus pileatus



#	Nombre científico	#	Nombre científico	#	Nombre científico
☐ 619	Ramphocelus dimidiatus	☐ 638	Emberizoides herbicola	☐ 657	Buthraupis montana
☐ 620	Ramphocelus flammigerus	☐ 639	Pseudospingus verticalis	☐ 658	Tephrophilus wetmorei
☐ 621	Tersina viridis	☐ 640	Cnemoscopus rubrirostris	☐ 659	Sporathraupis cyanocephala
☐ 622	Dacnis lineata	☐ 641	Kleinotheraupis atropileus	☐ 660	Chlorornis riefferii
☐ 623	Dacnis cayana	☐ 642	Sphenopsis frontalis	☐ 661	Cnemathraupis eximia
☐ 624	Sporophila minuta	☐ 643	Sphenopsis melanotis	☐ 662	Chalcothraupis ruficervix
☐ 625	Sporophila funerea	☐ 644	Thlypopsis supercilialis	☐ 663	Stilpnia heinei
☐ 626	Sporophila angolensis	☐ 645	Urothraupis stolzmanni	☐ 664	Stilpnia vitriolina
☐ 627	Sporophila crassirostris	☐ 646	Coereba flaveola	☐ 665	Stilpnia cyanicollis
☐ 628	Sporophila intermedia	☐ 647	Tiaris olivaceus	☐ 666	Tangara vassorii
☐ 629	Sporophila luctuosa	☐ 648	Asemospiza obscura	☐ 667	Tangara nigroviridis
☐ 630	Sporophila nigricollis	☐ 649	Melanospiza bicolor	☐ 668	Tangara labradorides
☐ 631	Sporophila schistacea	☐ 650	Schistochlamys melanopis	☐ 669	Tangara inornata
☐ 632	Sporophila plumbea	☐ 651	Iridosornis rufivertex	☐ 670	Tangara gyrola
☐ 633	Saltator maximus	☐ 652	Pipraeidea melanonota	☐ 671	Tangara xanthocephala
☐ 634	Saltator atripennis	☐ 653	Dubusia taeniata	☐ 672	Tangara parzudakii
☐ 635	Saltator coerulescens	☐ 654	Anisognathus lacrymosus	☐ 673	Tangara arthus
☐ 636	Saltator striatipectus	☐ 655	Anisognathus igniventris	☐ 674	Thraupis episcopus
☐ 637	Saltator cinctus	☐ 656	Anisognathus somptuosus	☐ 675	Thraupis palmarum



El municipio de Ibagué se ubica en la vertiente oriental de la cordillera Central, en el centro del departamento del Tolima. Situado en una amplia franja altitudinal, cuenta con una variedad de zonas de vida, desde el bosque seco tropical hasta el páramo fluvial subandino, circunstancias que permiten el establecimiento de una enorme biodiversidad. Entre la fauna más destacada se encuentran las aves, con cerca de 690 especies, incluidas alrededor de 200 encontradas en el casco urbano de la ciudad. Este libro compila la etimología, la descripción morfológica, los aspectos ecológicos, la dieta general, el estado de amenaza, su distribución en localidades destacadas dentro del municipio y la reseña fotográfica de 136 especies de aves, desde comunes hasta endémicas y de interés para el aviturismo. Sin lugar a dudas, este libro puede ser empleado para la educación ambiental en instituciones educativas del municipio, y por aquellos que se encuentran iniciando en la observación de aves, aficionados y académicos. Finalmente, este libro es uno de los resultados de un proyecto financiado por Colciencias en el programa Ideas para el cambio, diseñado y ejecutado por la Universidad de Ibagué junto con el trabajo colaborativo y participativo de los miembros de la Red de turismo de naturaleza del Tolima - RedNatur y participativo de la Red de naturaleza del Tolima - RedNatur.

Ibagué

Entre alas, colores y cantos
Guía de las aves más buscadas

ISBN: 978-958-754-359-9



9 789587 543599